

- 150.00 mm

ESPEJOS GRAF SAC		FECHA: 25-07-2011	COLORES: NEGRO 	OBSERVACIONES:
		VERSION: UV:1	PANT. AMARILLO C. 	
CLIENTE: QUIMICA SUIZA S.A.			PANT. 293 C 	
FORMATO: CAJA EVISETCT - S x 400g			PANT. ROJO QUIMICA SUIZA 	
MEDIDAS: 170 mm x 150 mm x 105 mm	PROGRAMA: COREL 14	OPERADOR: JORGE QUISPE LUQUE		

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO:
EVISECT es un insecticida de una nueva estructura química relacionada con las neurotoxinas (sustancia natural presente en ciertos anélidos marinos: *Limbrineris* sp.), con acción de contacto y estomacal, con efecto de penetración y translocación dentro del tejido de la hoja, lo cual ayuda a la acción estomacal. Controla insectos mastigadores y minadores.
 Diluir la dosis indicada en 5 litros de agua aproximadamente, agitar y verter esta premezcla en un cilindro o en el equipo de aplicación que contenga la dosis necesaria.

Consulte con un ingeniero agrónomo

CULTIVO	PLAGA		DOSIS			PC (días)	LMR (ppm)
	Nombre común	Nombre científico	Kg/ha	Kg/cil	%		
Aj. Pimiento	Gusano perforador	<i>Heliothis virescens</i>	0.30-0.40	0.15-0.20	-----	N.D.	3
Alcachofa	Mosca minadora	<i>Liomyza hudsonensis</i>	0.30-0.40	0.15-0.20	-----	N.D.	3
	Gusano defoliador	<i>Heliothis virescens</i>					
	Perforante de la hoja	<i>Bucculatrix thurberella</i>					
Algodón	Gusano mayor de la hoja	<i>Alabama argillacea</i>	0.5	-----	-----	15	0.02
	Gusano menor de la hoja	<i>Anomis texana</i>					
Cebolla	Thrips	<i>Thrips tabaci</i>	-----	0.1	0.05	N.D.	3
	Gusano defoliador	<i>Heliothis virescens</i>					
	Gusano cogollero	<i>Spodoptera frugiperda</i>	0.20-0.40	0.10-0.20	-----	N.D.	3
Espárrago	Gusano defoliador	<i>Copitarsia turbata</i>					
	Thrips	<i>Thrips tabaci</i>	-----	0.1	0.05		
	Thrips	<i>Thrips tabaci</i>	-----	0.15-0.20	0.075-0.1	14	3
Granado	Thrips del palto	<i>Heliothrips haemorrhoidalis</i>	-----	0.1	0.05	N.D.	3
Palto	Pollita	<i>Tuta absoluta</i>	0.70	0.35	-----	15	3
Tomate	Mosca blanca	<i>Bemisia tabaci</i>	0.30-0.40	0.15-0.20	-----	15	3
Vid	Thrips	<i>Thrips tabaci</i>	-----	0.1	0.05	14	3
	Pollita de la papa	<i>Phthorimaea operculella</i>	0.60	-----	-----	N.D.	0.01
Papa	Thrips	<i>Thrips tabaci</i>	0.20-0.30	-----	-----	N.D.	0.01

P.C.: Periodo de Carencia / N.D.: No determinado / LMR: Límite máximo de residuo

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN

Para lograr mejores resultados tanto biológicos como económicos **EVISECT[®]-S** debe aplicarse tan pronto como se observen los primeros daños en el cultivo. La aplicación en el cultivo de algodónero deberá efectuarse con estadios larvarios 1 y 2 y/o cuando el 10% de las plantas estén afectadas. En el cultivo de tomate aplicar con 10% de brotes infestados y/o con estadios larvarios 1 y 2.

PERIODO DE REINGRESO:

No entre a las áreas tratadas durante las 24 primeras horas después de la aplicación.

COMPATIBILIDAD

EVISECT®-S es compatible con la mayoría de plaguicidas de uso común, sin embargo en caso de duda es recomendable efectuar una prueba previa de compatibilidad.

FITOTOXICIDAD

EVISECT®-S La aplicación de Dosis superiores a las señaladas en el cuadro de usos, podrían ocasionar fitotoxicidad en el cultivo. Aplicar sólo las dosis señaladas en el cuadro de usos.

RESPONSABILIDAD CIVIL:

El titular de registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para lo fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo a las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular de registro o con el distribuidor del producto.