

150.00 mm

EVISECT®-S

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Conservar el producto en el envase original etiquetado y cerrado.
- Después de usar el producto cámbiese lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Utilice ropa protectora durante el manejo y aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

- Grupo químico: Análogo de la nereis toxina
- En caso de intoxicación, llame al médico inmediatamente, o lleve el paciente al médico y muéstrela la etiqueta.
- En caso de contacto con los ojos lavarlos con abundante agua fresca y si el contacto fuese con la piel, lavarse con abundante agua y jabón.
- En caso de ingestión accidental suministrar carbón medicinal.
- No dar de beber nada a un paciente que se encuentre inconsciente.
- **Antídoto:** Aplicar una inyección intravenosa de 1-cysteine a la dosis de 12,5 a 25 mg por kilogramo de peso.

Teléfono de la empresa: (01) 221-5729

EVISECT®-S

Composición:
 Thiocyclam-hidrogenoxalato.....500 g/kg
 Aditivos.....c.s.p. 1kg

Titular del Registro: **ARYSTA LIFESCIENCE PERÚ S.A.C.**
Jr. Caracas N° 2226 Urb. Oyague
Jesús María - Lima - Perú

 **Arysta**
LifeScience
Innovation. Agility. Results.

Formulador: Syngenta Crop Protection AG

Importador y Distribuidor: SERFI S.A.
Av. República de Panamá 2577
La Victoria - Lima - Perú
Telf. 710-4068

Fecha de Formulación:
Nº de Lote:
Contenido Neto: **800 g**
Fecha de vencimiento:

®Es marca registrada de Nippon Kayaku Co., Ltd.

NO EXPLOSIVO

**MODERADAMENTE PELIGROSO
DAÑINO**

EVISECT®-S

CONDICIONES DE MANEJO Y DE DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe reutilizarse. Después de usar el contenido inutilice la funda o bolsa cortándola. Entréguela o deposítela en el lugar de destino dispuesto por la autoridad competente, para su gestión.

- En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en el sitio destinado por las autoridades para tal fin.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de aplicación o sobrantes del producto.

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO:
EIVISECT® es un insecticida de una nueva estructura química relacionada con las neurotoxinas (sustancia natural presente en ciertos anélidos marinos: *Lumbrineris sp.*), con acción de contacto y estomacal, con efecto de penetración y translocación dentro del tejido de la hoja, lo cual ayuda a la acción estomacal. Controla insectos masticadores y minadores.
 Diluir la dosis indicada en 5 litros de agua aproximadamente, agitar y verter esta premezcla en un cilindro o en el equipo de aplicación que contenga la cantidad de agua necesaria.

Consulte con un ingeniero agrónomo

CULTIVO	PLAGA		DOSIS			PC	LMR
	Nombre común	Nombre científico	Kg/ha	Kg/cil	%	(días)	(ppm)
Ají, Pimiento	Gusano perforador	<i>Heliothis virescens</i>	0.30-0.40	0.15-0.20	-----	N.D.	3
Alcachofa	Mosca minadora	<i>Liriomyza huidobrensis</i>					
	Gusano defoliador	<i>Heliothis virescens</i>	0.30-0.40	0.15-0.20	-----	N.D.	3
Algodón	Perforador de la hoja	<i>Bucculatrix thurberella</i>					
	Gusano mayor de la hoja	<i>Alabama argillacea</i>	0.5	-----	-----	15	0.02
	Gusano menor de la hoja	<i>Anomis texana</i>					
Cebolla	Thrips	<i>Thrips tabaci</i>	-----	0.1	0.05	N.D.	3
	Gusano defoliador	<i>Heliothis virescens</i>					
	Gusano cogollero	<i>Spodoptera frugiperda</i>	0.20-0.40	0.10-0.20	-----	N.D.	3
	Gusano defoliador	<i>Copitarsia turbata</i>					
	Thrips	<i>Thrips tabaci</i>	-----	0.1	0.05		
Espárrago	Thrips	<i>Thrips tabaci</i>	-----	0.15-0.20	0.075-0.1	14	3
Granado	Thrips del pajo	<i>Heliothrips haemorrhoidalis</i>	-----	0.1	0.05	N.D.	3
Palto	Polilla	<i>Tuta absoluta</i>	0.70	0.35			
Tomate	Mosca blanca	<i>Bemisia tabaci</i>	0.30-0.40	0.15-0.20	-----	15	3
Vid	Thrips	<i>Thrips tabaci</i>	-----	0.1	0.05	14	3
	Polilla de la papa	<i>Phthorimaea operculella</i>	0.60	-----	-----	N.D.	0.01
Papa	Thrips	<i>Thrips tabaci</i>	0.20-0.30	-----	-----	N.D.	0.01

P.C.: Periodo de Carencia / N.D.: No determinado / LMR: Límite máximo de residuo

Para lograr mejores resultados tanto biológicos como económicos **EVISECT®-S** debe aplicarse tan pronto como se observen los primeros daños en el cultivo. La aplicación en el cultivo de algodónero deberá efectuarse con estadíos larvarios 1 y 2 y/o cuando el 10% de las plantas estén afectadas. En el cultivo de tomate aplicar con 10% de brotes infestados y/o con estadíos larvarios 1 y 2.

No entre a las áreas tratadas durante las 24 primeras horas después de la aplicación.

EVISECT®S es compatible con la mayoría de plaguicidas de uso común, sin embargo en caso de duda es recomendable efectuar una prueba previa de compatibilidad.

EVISECT®-S La aplicación de Dosis superiores a las señaladas en el cuadro de usos, podrían ocasionar fitotoxicidad en el cultivo. Aplicar sólo las dosis señaladas en el cuadro de usos.

El titular de registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para lo fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo a las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular de registro o con el distribuidor del producto.

