10.5 cm

15 cm

10.5 cm

15 cm

Evisect®-S

ESPEJOS GRAF SAC	FECHA: 18-09-2013	COLORES:	OBSERVACIONES:
	VERSION: UV:1	NEGRO PANT. AMARILLO C. PANT. 293 C PANT. ROJO QUIMICA SUIZA	
CLIENTE: QUIMICA SUIZA INDUSTRIAL S.A.			
FORMATO: CAJA EVISETCT - S x 800 g			
MEDIDAS: 17 cm x 15 cm x 10.5 cm	PROGRAMA: COREL 16	OPERADOR: JORGE QUISPE LUQUE	

17 cm

Evisect®-S

"LEA CUIDADOSAMENTE ESTA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO"
"MANTÉNGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezclas y aplicación.
- Conservar el producto en el envase original etiquetado y cerrado.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

PRIMEROS AUXILIOS
Grupo Químico: Análogo de la nereistoxina.

- En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente y muéstrele la etiqueta.
- En caso de contacto con la piel y los ojos lavarlos con abundante agua fresca, y si el contacto fuese con la piel, lavarse con abundante agua y jabón.
- En caso de ingestión accidental suministrar carbón medicinal.
- No dar de beber nada a un paciente que se encuentra inconsciente.

Antídoto: Aplicar una inyección intravenosa de 1-cysteine a las dosis de 12,5 a 25 mg por kilogramo de peso.

Teléfonos de emergencia toxicológica:
CICOTOX: 0800-1-3040
ALO EsSalud: 472-2300 (emergencias 24 horas)

Evisect®-S

INSECTICIDA AGRÍCOLA

POLVO SOLUBLE - SP

Composición:
Thiocyclam-hydrogenoxalato ..... 500 g/kg
Aditivos .....c.s.p. 1 kg

Reg. Nº 109-96-AG-SENASA

Importado y Distribuido por:

QSI
QUIMICA SUIZA INDUSTRIAL DEL PERU S.A.

Av. República de Panamá 2577
La Victoria Lima - Perú.
Telf. 710-4000

Contenido Neto: 800 g

Formulado por:
FORMULACIONES QUIMICAS S.A.
CHOMES-Punta Arenas
Telf.: 638-8283 - Costa Rica

Titular del Registro
Arysta LifeScience
Harvest to Growth
Av. Arenales 395 of. 603, Lima 1,
Telf. 332-6633

NO CORROSIVO **NO INFLAMABLE** **NO EXPLOSIVO**

Moderadamente Peligroso
DAÑINO

Evisect®-S

"LEA CUIDADOSAMENTE ESTA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO"
"MANTÉNGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

Después de usar el contenido, destruya este envase, y depósitelo en lo sitios destinados por las autoridades locales para este fin.

No utilice este envase para conservar alimentos o agua.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE

En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en el sitio destinado para este fin.

No contaminar las fuentes de agua con los restos de aplicación o sobrante del producto.

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO
Evisect-S es un insecticida de una nueva estructura química relacionada con las neurotoxinas (sustancia natural presente en ciertos anélidos marinos: *Lumbrineris spp.*), con acción de contacto y estomacal, con efecto de penetración y translocación dentro del tejido de la hoja, lo cual ayuda a la acción estomacal. Controla insectos masticadores y minadores.
Diluir la dosis indicada en 5 litros de agua aprox., agitar y verter esta pre-mezcla en un cilindro o en el equipo de aplicación que contenga la cantidad de agua necesaria.

CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO

USOS Y DOSIFICACIONES RECOMENDADAS

CULTIVO	PLAGA		DOSIS			PC (días)	LMR (ppm)
	Nombre Común	Nombre Científico	Kg/ha	Kg/cil	%		
Ají, Pimiento	Gusano Perforador	*Heliothis virescens*	0.30-0.40	0.15-0.20	----	N.D.	3
Alcachofa	Mosca Minadora	*Liriomyza huidobrensis*	0.30-0.40	0.15-0.20	----	N.D.	3
	Gusano defoliador	*Heliothis virescens*					
Algodón	Perforador de la hoja	*Bucculatrix thurberiella*	0.5	----	----	15	0.02
	Gusano mayor de la hoja	*Alabama argillacea*					
	Gusano menor de la hoja	*Anomis texana*					
Cebolla	Thrips	*Thrips tabaci*	----	0.1	0.05	N.D.	3
Espárrago	Gusano defoliador	*Heliothis virescens*	0.20-0.40	0.10-0.20	----	N.D.	3
	Gusano cogollero	*Spodoptera frugiperda*					
	Gusano defoliador	*Copitarsia turbata*					
	Thrips	*Thrips tabaci*	----	0.1	0.05		
Palto	Trips del palto	*Heliothrips haemorrhoidales*	----	0.1	0.05	N.D.	3
Tomate	Polilla	*Tuta absoluta*	0.70	0.35	----	15	3
	Mosca blanca	*Bemisia tabaci*	0.30-0.40	0.15-0.20			
Vid	Thrips	*Thrips tabaci*	----	0.1	0.05	14	3

P.C.: Periodo de Carencia / ND.: No determinado / L.M.R.: Límite máximo de residuo

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN
Para lograr mejores resultados tanto biológicos como económicos **Evisect- S** debe aplicarse tan pronto como se observen los primeros daños en el cultivo.
La aplicación en el cultivo del algodonero deberá efectuarse con estadíos larvarios 1 y 2 y/o cuando el 10% de las plantas esté afectados.
En el cultivo de tomate aplicar con 10% de brotes infestados y/o con estadíos larvarios 1 y 2.

PERIODO DE REINGRESO
No entre a las áreas tratadas durante las 24 primeras horas después de la aplicación.

COMPATIBILIDAD
Evisect-S es compatible con la mayoría de plaguicidas de uso común, sin embargo en caso de duda es recomendable efectuar una prueba previa de compatibilidad.

FITOTOXICIDAD
Evisect-S no es fitotóxico a los cultivos indicados en la etiqueta.

RESPONSABILIDAD CIVIL
El Titular del Registro garantiza que las características fisicoquímicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.

17 cm