10.5 cm

15 cm

10.5 cm

15 cm

EVISECT®-S

ESPEJOS GRAF SAC	FECHA: 25-07-2011	COLORES: NEGRO	OBSERVACIONES:
	VERSION: UV:1	PANT. AMARILLO C.	
CLIENTE: QUIMICA SUIZA S.A.		PANT. 293 C	
FORMATO: CAJA EVISETCT - S x 400g		PANT. ROJO QUIMICA SUIZA	
MEDIDAS: 170 mm x 150 mm x 105 mm	PROGRAMA: COREL 14	OPERADOR: JORGE QUISPE LUQUE	

17 cm

EVISECT®-S

LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO
MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Conservar el producto en el envase original etiquetado y cerrado.
- Después de usar el producto cámbiese lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

PRIMEROS AUXILIOS
- Grupo químico: Análogo de la nereistoxina
- En caso de intoxicación, llame al médico inmediatamente, o lleve el paciente al médico y muéstrele la etiqueta.
- En caso de contacto con los ojos lavarlos con abundante agua fresca y si el contacto fuese con la piel, lavarse con abundante agua y jabón.
- En caso de ingestión accidental suministrar carbón medicinal.
- No dar de beber nada a un paciente que se encuentre inconsciente.
- En caso de emergencia llamar a los siguientes teléfonos:

CICOTOX: 0800-1-3040 **ESSSALUD:** 117

Antídoto: Aplicar una inyección intravenosa de 1-cysteine a la dosis de 12,5 a 25 mg por kilogramo de peso.

EVISECT®-S

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

INSECTICIDA AGRÍCOLA

POLVO SOLUBLE (SP)

Composición:
Thiocyclam-hydrogenoxalato.....500 g/kg
Aditivos.....c.s.p. 1kg

Reg. Nº 109-96-AG-SENASA

Titular del Registro:
ARYSTA LIFESCIENCE PERÚ S.A.C.
Jr. Caracas N° 2226 Urb. Oyague
Jesús María - Lima - Perú

Formulado por:
Nippon Kayaku Co., Ltd.
1-1, Marunouchi 2-chome, Chiyoda-ku,
Tokyo, Japón

Importado y Distribuido por:
Química Suiza Industrial del Perú S.A.
Av. República de Panamá 2577
La Victoria - Lima - Perú
Telf. 710-400

Fecha de Formulación:
N° de Lote:
Contenido Neto: **800 g**
Fecha de vencimiento:

®Es marca registrada de Nippon Kayaku Co., Ltd.

NO CORROSIVO

NO INFLAMABLE

NO EXPLOSIVO

MODERADAMENTE PELIGROSO

EVISECT®-S

LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO
MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS
- Después de usar el contenido destruya este envase y depositelo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin.
- No utilice este envase para almacenar alimentos o agua.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE
- En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en el sitio destinado por las autoridades para tal fin.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de aplicación o sobrantes del producto.

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO
EVISECT®-S es un insecticida de una nueva estructura química relacionada con las neurotoxinas (sustancia natural presente en ciertos anélidos marinos: *Lumbrineris spp.*), con acción de contacto y estomacal, con efecto de penetración y translocación dentro del tejido de la hoja, lo cual ayuda a la acción estomacal. Controla insectos masticadores y minadores.

Diluir la dosis indicada en 5 litros de agua aproximadamente., agitar y verter esta pre mezcla en un cilindro o en el equipo de aplicación que contenga la cantidad de agua necesaria.

CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO

CUADRO DE USO

CULTIVO	PLAGA		DOSIS			PC (días)	LMR (ppm)
	Nombre Común	Nombre Científico	Kg/ha	Kg/cil	%		
Ají, Pimiento	Gusano Perforador	*Heliothis virescens*	0.30-0.40	0.15-0.20	------	N.D.	3
Alcachofa	Mosca Minadora	*Liriomyza huidobrensis*	0.30-0.40	0.15-0.20	------	N.D.	3
	Gusano defoliador	*Heliothis virescens*					
Algodón	Perforador de la hoja	*Bucculatrix thurberiella*	0.5	------	------	15	0.02
	Gusano mayor de la hoja	*Alabama argillacea*					
	Gusano menor de la hoja	*Anomis texana*					
Cebolla	Thrips	*Thrips tabaci*	------	0.1	0.05	N.D.	3
Espárrago	Gusano defoliador	*Heliothis virescens*	0.20-0.40	0.10-0.20	------	N.D.	3
	Gusano cogollero	*Spodoptera frugiperda*					
	Gusano defoliador	*Copitarsia turbata*					
	Thrips	*Thrips tabaci*	------	0.1	0.05		
Granado	Thrips	*Thrips tabaci*	------	0.15-0.20	0.075-0.1	14	3
Palto	Thrips del palto	*Heliothrips haemorrhoidalis*	------	0.1	0.05	N.D.	3
Tomate	Polilla	*Tuta absoluta*	0.70	0.35	------	15	3
	Mosca blanca	*Bemisia tabaci*	0.30-0.40	0.15-0.20			
Vid	Thrips	*Thrips tabaci*	------	0.1	0.05	14	3

P.C.: Periodo de Carencia / N.D.: No determinado / LMR: Límite máximo de residuo

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN
Para lograr mejores resultados tanto biológicos como económicos **EVISECT®-S** debe aplicarse tan pronto como se observen los primeros daños en el cultivo.
La aplicación en el cultivo de algodonero deberá efectuarse con estadíos larvarios 1 y 2 y/o cuando el 10% de las plantas esté afectados.
En el cultivo de tomate aplicar con 10% de brotes infestados y/o con estadios larvarios 1 y 2.

PERIODO DE REINGRESO
No entre a las áreas tratadas durante las 24 primeras horas después de la aplicación.

COMPATIBILIDAD
EVISECT®-S es compatible con la mayoría de plaguicidas de uso común, sin embargo en caso de duda es recomendable efectuar una prueba previa de compatibilidad.

FITOTOXICIDAD
EVISECT®-S no es fitotóxico a los cultivos indicados en la etiqueta.

RESPONSABILIDAD CIVIL
El Titular del Registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.

17 cm