

Zampro®DM

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

FUNGICIDA AGRÍCOLA

SUSPENSIÓN CONCENTRADA (SC)

COMPOSICION:

Dimethomorph..... 225 g/L
Amectoctradin..... 300 g/L
Aditivosc.s.p. 1 L

Reg. PQUA N° 772 - SENASA

TITULAR DEL REGISTRO, IMPORTADO Y

DISTRIBUIDO POR:

BASF Peruana S.A.

Av. O. R. Benavides 5915 – Callao

Casilla 3911, Lima 100

Tel: (01) 513 2500

Fax: (01) 513 2519



We create chemistry

FORMULADO POR :

BASF S.A.

Av Brasil 791 Bairro Eng. Neiva, Guaratinguetá SP

-Brasil

Contenido Neto: 5 L

N° de Lote:

Fecha de Formulación:

Fecha de Vencimiento:

NO CORROSIVO NO INFLAMABLE NO EXPLOSIVO



**MODERADAMENTE PELIGROSO
DAÑINO**

**LEA LA ETIQUETA Y LA HOJA INFORMATIVA
ADJUNTA ANTES DE USAR EL PRODUCTO
MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE
DE LOS NIÑOS**

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

Zampro®DM (i.a. dimethomorph + amectoctradin) es un fungicida sistémico con acción protectante y curativa, que ataca los estados vegetativos y reproductivos del hongo, inhibe la liberación de las esporas y su germinación. Código FRAC: Dimethomorph 40, Amectoctradin 45.

PRIMEROS AUXILIOS

- Grupo Químico: Morfolina + Triazolopyrimidine
- En caso de intoxicación, llame al médico inmediatamente o lleve al paciente al centro médico y mostrarle la etiqueta.
- Este producto no tiene antídoto específico. El tratamiento es sintomático.
- En caso de ingestión: No provocar nunca el vómito o suministrar algo por la boca, cuando la persona afectada está inconsciente o padece convulsiones. Si la persona afectada está en condiciones de deglutir, permítale tomar lentamente sorbos de agua. Solicitar atención médica inmediata o lleve al paciente al centro médico llevando la etiqueta.
- En caso de inhalación: Mover a la persona a un área ventilada, dar respiración artificial si es necesario, llamar al médico.
- En caso de contacto con la piel: Retirar la ropa contaminada. Lavar la piel con abundante agua por 15-20 minutos. Llamar al médico.
- En caso de contacto con los ojos: Lavar lentamente bajo agua corriente durante 15 a 20 minutos. En caso de llevar lentes de contacto, retirarlos transcurridos los primeros 5 minutos y continuar con el proceso de lavado.

FRECUENCIA Y MOMENTO DE APLICACIÓN

- Efectuar las aplicaciones cuando las condiciones climáticas sean favorables para el desarrollo de la enfermedad o cuando se observen los primeros síntomas.
- Papa: Efectuar buena cobertura sobre el follaje, especialmente en el estado fenológico de inicio de floración con un gasto de agua no menor a 500 L/ha.
- Vid: Aplicar al inicio de la enfermedad, tan pronto como se detecten los síntomas iniciales. Repetir la aplicación en caso de ser necesario, alternar con productos de diferente mecanismo de acción.

Aplicar Zampro®DM (i.a. dimethomorph + amectoctradin) dos aplicaciones por campaña /año como máximo.

RESPONSABILIDAD CIVIL:

"El titular del Registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas"

