

| “CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO”<br>ADVERTENCIA: USO PERMITIDO SOLO EN LOS CULTIVOS Y PLAGAS AUTORIZADOS |                        |                              |           |         |                |                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------------|-----------|---------|----------------|-----------------|
| CULTIVO                                                                                                      | PLAGA                  |                              | DOSIS     |         | P.C.<br>(días) | L.M.R.<br>(ppm) |
|                                                                                                              | Nombre Común           | Nombre Técnico               | kg /200 L | kg /Ha  |                |                 |
| ESPÁRRAGO                                                                                                    | “Barrenador de brotes” | <i>Heliothis virescens</i>   | 0.2       | 0.4     | 1              | 2               |
| TOMATE                                                                                                       | “Gusano ejército”      | <i>Spodoptera eridania</i>   | 0.2       | 0.4     | 2              | 0.5             |
| MAIZ                                                                                                         | “Gusano cogollero”     | <i>Spodoptera frugiperda</i> | 0.25-0.3  | 0.5-0.6 | 14             | 0.02            |
| ESPÁRRAGO                                                                                                    | “Gusano cogollero”     | <i>Spodoptera frugiperda</i> | 0.25      | 0.5     | 1              | 2               |

P.C. Periodo de carencia      L.M.R. Límite máximo de residuos

**INTRUCCIONES DE USO Y MANEJO:**  
**LANNACROP 90 SP** es un insecticida sistémico de amplio espectro que actúa por contacto e ingestión.  
**LANNACROP 90 SP** controla eficientemente insectos picadores chupadores y larvas comedoras de follaje.  
**LANNACROP 90 SP** puede ser aplicado con equipos convencionales terrestres con mochilas a palanca, a motor, tecnomas, parihuelas, etc.

**FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN:**  
Iniciar la aplicación de **LANNACROP 90 SP** cuando se observen los primeros indicios del ataque d ela plaga.  
Toda aplicación debe ser posterior a una evaluación rigurosa del cultivo, el nivel de daño dependerá de la interacción plaga-cultivo.  
En los cultivos de espárrago y tomate se recomienda hasta un máximo de 2 aplicaciones por campaña. En el cultivo de maíz se recomienda hasta un máximo de 1 aplicación por campaña.  
Rotar con plaguicidas de diferente grupo químico entre aplicaciones.

**PERIODO DE REINGRESO:** Puede reingresar sin equipo de protección 48 después de aplicado el producto.  
**COMPATIBILIDAD:** **LANNACROP 90 SP** es compatible con la mayoría de plaguicidas de uso común excepto con aquellas de reacción fuertemente alcalina u oxidante.

**FITOTOXICIDAD:** El producto no es fitotóxico cuando es utilizado según las indicaciones de la etiqueta.

**EFFECTO SOBRE OTROS CULTIVOS:** **LANNACROP 90 SP** no tiene efecto negativo sobre otros cultivos

**RESPONSABILIDAD CIVIL:** El Titular del Registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las indicaciones e instrucciones dadas.

LEA ESTA HOJA INFORMATIVA ANTES DE USAR EL PRODUCTO, MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

# LANNACROP 90 SP

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

INSECTICIDA AGRÍCOLA  
POLVO SOLUBLE - SP

**COMPOSICIÓN**  
Methomyl ..... 900 g/kg  
Aditivos ..... c.s.p. 1kg

Reg. PQUA N° 775 - SENASA  
“VENTA SÓLO POR PRESCRIPCIÓN DE UN INGENIERO AGRÓNOMO”  
TITULAR DEL REGISTRO : CROP BUSINESS S.A.C.

Nombre químico (IUPAC):  
S-methyl N-(methylcarbamoyloxy) thioacetimidate  
Fórmula empírica:  $C_5H_{10}N_2O_2S$   
Fórmula estructural:

Peso molecular: 162.2 g/mol  
Grupo químico: Carbamato

**Propiedades físicas y químicas:**  
Estado físico: Polvo  
Color: Blanco  
Olor: Ligeramente sulfuroso  
pH : 5.0 - 7.0

**Capacidad y clase de los envases en los que se comercializa el producto:**  
Presentaciones bolsas de aluminio trilaminado por 100 gramos (incluyendo bolsa hidrosoluble), caja de 1 Kg incluyendo 10 bolsas por 100 gr.  
**Mecanismo de acción:** **LANNACROP 90 SP** es un insecticida sistémico que actúa por contacto e ingestión. Es un inhibidor de la colinesterasa en el sistema nervioso, por lo que la estimulación nerviosa es interrumpida en el insecto causando espasmos, dureza y muerte del insecto.

Importado y Distribuido por:  
**CROP BUSINESS S.A.C.**  
*Asignada en franquicia*  
Calle Toledo N° 161 Dpto. 201 Urbanización  
Mayorazgo IV Etapa - ATE - LIMA  
Teléfono: 349-2669

Formulado por:  
SHANGHAI E-TONG CHEMICAL CO. LTD.  
N° 23, Lane 5398, Shenzhuan Road  
Songjiang District - Shanghai  
CHINA

NO CORROSIVO      NO INFLAMABLE      NO EXPLOSIVO



ALTAMENTE PELIGROSO  
TÓXICO



LEA ESTA HOJA INFORMATIVA ANTES DE USAR EL PRODUCTO, MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

**PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN**  
• Evitar el contacto con los ojos, la piel y la ropa.  
• Evitar respirar polvos ó inhalar, es ligeramente peligroso.  
• Causa irritación moderada a los ojos.  
• No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.  
• Guardar este producto en su envase original, etiquetado y cerrado.  
• No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, bebidas, medicinas ni forrajes.  
• Utilizar ropa protectora durante el manipuleo, aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.  
• Después de usar el producto, báñese con abundante agua y jabón, cámbiese y lave la ropa contaminada.  
• Realice la operación de aplicación siguiendo la dirección del viento.  
• Después de la mezcla y aplicación, lavarse y cambiarse de ropa y lavarla antes de volver a usarla.

**INSTRUCCIONES DE ALMACENAMIENTO:**  
- No almacenar en casas de habitación.  
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.  
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.  
- No reenvasar o depositar el contenido en otros envases.

**PRIMEROS AUXILIOS:**  
• **Grupo químico: Carbamatos**  
• En caso de ingestión, no administrar nada por vía oral si la persona está inconsciente, no inducir al vómito.  
• En caso de contacto con los ojos: levantar los párpados y lavar los ojos con abundante agua y jabón.  
• En caso de contacto con la piel; retirar la ropa contaminada y lavar la piel con abundante agua y jabón por 20 minutos.  
• En caso de inhalación: Mantener a la persona al aire libre, brindar respiración artificial si fuera necesario, llamar al médico.  
• Tratamiento médico: Administrar Sulfato de Atropina por vía intravenosa o vía intramuscular.

**NOTA AL MÉDICO:**  
• Antídoto: Sulfato de atropina.  
• Administrar 2.1 mg de sulfato de atropina via intravenosa o intramuscular para adultos. Repetir la dosis en 10 intervalos de 30 minutos hasta que los síntomas se alivien. En niños (menores de 13 años) administrar 0.05 mg/kg de sulfato de atropina y repetir cada 15-30 minutos hasta que se logre la completa atropinización.

LEA ESTA HOJA INFORMATIVA ANTES DE USAR EL PRODUCTO MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

TELÉFONOS DE EMERGENCIA:  
CICOTOX : 0800-1-3040      CROP BUSINESS SAC: 349-2669  
ESSALUD:080-10200

**MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS:**  
- Después de usar el contenido, destruya este envase y deposítelo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin.

**MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE:**  
• Altamente peligroso para abejas  
• Peligroso para organismos acuáticos.  
• No contaminar lagos, ríos, estanques o acequías con los desechos y envases vacíos.  
• Peligroso para los animales domésticos, aves, fauna y flora silvestre.  
• No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.  
• Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 5 metros.  
• En caso de derrame, recoger el producto y depositarlo en el sitio destinado por las autoridades locales para este fin.  
• El producto no debe aplicarse en zonas con napas freáticas superficiales ó de suelos altamente permeables.

**LAVADO DEL EQUIPO DE APLICACIÓN:**  
- Llenar 1/3 del volumen del tanque con agua limpia, adicione detergente y agite vigorosamente. Repita dicha operación al menos dos veces más. Enjuagar el equipo con agua limpia y limpiar la parte externa con un paño húmedo.  
- Remueva los filtros y boquillas, límpielos sumergiéndolos en un recipiente con agua limpia.  
- El agua procedente de la limpieza del equipo de aplicación debe ser vertido en terreno baldío, borde de camino, lejos de personas, animales, cultivos y fuentes de agua. No verter sobre suelo altamente permeable.



ALTAMENTE PELIGROSO  
TÓXICO

