PRIMEROS AUXILIOS
Al contacto con la piel, lavar la zona afectado con abundante agua y jabón.
NOTAS AL MEDICO
Tratamiento sintomático si aparece diarrea.
No se recomienda el lavado gástrico a menos que se haya ingerido grandes cantidades.
DL 50 Oral Aguda: > 2.000 mg/kg
DL 50 Dermal Aguda: > 4.000 mg/kg

INFLAMABLE

NO CORROSIVO

NO EXPLOSIVO

Lote Nº:
F. de Form:
F. de Venc:
® Marca registrada

RIVAL®

(Acido Giberelico)

REGULADOR DE CRECIMIENTO DE PLANTAS

Concentrado Soluble (SL)

COMPOSICIÓN:
Acido Giberelico..... 40.0 g/l
Alcohol isopropilico ..... 758.0 g/l

Registro PBUA N°0228-SENASA

Titular de Registro, Formulador y Distribuidor:

Comercial Andina Industrial S.A.C.

Av. Benavides 1579. 7mo piso. Oficina 702. Edificio Del Park II. Lima 18 - Perú
Telf.: (01) 253-6444 - Fax: 271-1988 / atencionalcliente@grupoandina.com.pe

Contenido Neto: 125 ml

CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO
CUADRO DE USOS

CULTIVO	Dosis x 200 L agua	Momento de uso	LMR (ppm)	P.C. (días)
ALCACHOFA	125 cc	La aplicación deberá realizarse durante el desarrollo vegetativo (60,75 y 90 días)	5	7
CEBOLLA	25 - 50 cc	La aplicación deberá ser foliar cuando el cultivo tenga 40 días después de realizado el transplante.	5	15

RESPONSABILIDAD CIVIL:
El titular de registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a la anotada en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.

LIGERAMENTE TÓXICO
PRECAUCIÓN