RIVAL®

(Acido Giberelico)

REGULADOR DE CRECIMIENTO DE PLANTAS

Concentrado Soluble (SL)

COMPOSICIÓN:

Acido Giberelico..... 40.0 g/l
Alcohol isopropilico ..... 758.0 g/l

Registro PBUA N°0228-SENASA

INFLAMABLE **NO CORROSIVO** **NO EXPLOSIVO**

LIGERAMENTE TÓXICO
PRECAUCIÓN

Formula empírica: $C_{19}H_{22}O_6$
Peso molecular: 346.38
Formula estructural:



Titular de Registro, Formulador y Distribuidor:
Comercial Andina Industrial S.A.C.
Av. Benavides 1579. 7mo piso. Oficina 702 . Edificio Del Park II. Lima 18 - Perú
Telf.: (01) 253-6444 - Fax: 271-1988
atencionalcliente@grupoandina.com.pe

"LEA CUIDADOSAMENTE ESTA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO"

"MANTÉNGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

Propiedades Físicas y químicas del producto formulado

Estado: Líquido
Color: Blanco
Punto de fusión: 223-225° C
Punto de inflamación: Inflamable
Estabilidad: 2 años mínimo

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- No comer, beber ni fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 12 horas.
- Conserve en lugar seco y en su envase original.
- No lo transporte, ni almacene con alimentos y/o animales.
- Usar la mezcla inmediatamente después de preparada.
- Mantenga el envase bien cerrado y etiquetado.
- No reuse el envase, destrúyalo.
- No contamine los arroyos con el lavado de equipos de aspersión o con la eliminación de residuos.

PRIMEROS AUXILIOS

- Al contacto con la piel, lavar la zona afectada con abundante agua y jabón.

NOTAS AL MÉDICO

- Tratamiento sintomático si aparece diarrea. No se recomienda el lavado gástrico a menos que se haya ingerido grandes cantidades.

DL 50 Oral Aguda: > 2.000 mg/kg
DL 50 Dermal Aguda: > 4.000 mg/kg

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

1.- Después de usar el producto, enjuague 3 veces el envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación, y luego inutilícelo, triturándolo o perforándolo y depositelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.

2.- Realizar obligatoriamente el Triple Lavado del presente envase.

3.- Devuelva el envase Triple Lavado al centro de acopio.

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

RIVAL® es un regulador de crecimiento de plantas que favorece el rendimiento del cultivo.

PREPARACIÓN Y APLICACIÓN

RIVAL® se emplea diluido en agua; preparar una pre mezcla de acuerdo a la dosis recomendada, en un tercio del volumen de agua a utilizar. Agitar bien y completar el volumen de agua de aplicación.

RIVAL® puede ser aplicado con cualquier equipo convencional terrestre (mochilas a palanca o motor, parihuelas, etc.). Antes de iniciar la aplicación, asegurarse que el equipo se encuentre en perfecto estado de funcionamiento y correctamente calibrado

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

CUADRO DE USOS:

CULTIVO	Dosis x 200 L agua	Momento de uso	LMR (ppm)	P.C. (días)
ALCACHOFA	125 cc	La aplicación deberá realizarse durante el desarrollo vegetativo (60,75 y 90 días).	5	7
CEBOLLA	25 - 50 cc	La aplicación deberá ser foliar cuando el cultivo tenga 40 días después de realizado el transplante.	5	15

RESPONSABILIDAD CIVIL:

El titular de registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a la anotada en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.

RIVAL®

(Acido Giberelico)

REGULADOR DE CRECIMIENTO DE PLANTAS