

29.2 cm

“LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO”  
“MANTÉNGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS”

**PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN**

- Este producto puede ser mortal si se ingiere.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Utilice el equipo de protección durante la mezcla, aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas, ni forrajes.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.
- Después de usar el producto, cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- No utilizar el envase vacío para almacenar bebidas ni alimentos.

**PRIMEROS AUXILIOS**

**Grupo Químico: Triazolés**

- En caso de intoxicación, lleve el paciente inmediatamente al médico y muéstrele la etiqueta.
- En caso de ingestión, no provoque el vómito, ni dar de beber agua a la persona si está inconsciente.
- En caso de contacto con los ojos, manténgalos abiertos y lávelos inmediatamente con agua limpia durante 15 min. Lleve al paciente al oftalmólogo.
- En caso de contacto con la piel, retire la ropa y zapatos y lavar con abundante agua y jabón.
- En caso de inhalación retire al paciente a un lugar fresco y aplique respiración artificial si fuera necesario.
- No tiene antidoto, dar tratamiento sintomático.

En caso de emergencia llamar  
Cicotox: 0800-15040  
Cisproquim: 0800-50-847  
Essalud: 117 (línea gratuita) CAISAC: 253-6444

**CONDICIONES DE MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS**

- Después de usar el producto, enjuague 3 veces el envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación, y luego inutilícelo, triturándolo o perforándolo y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.
- Realizar obligatoriamente el Triple Lavado del presente envase.
- Devuelva el envase Triple Lavado al centro de acopio autorizado.



**MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE**

- Peligroso para abejas u otros artrópodos benéficos.
- No aplicar en época de floración del cultivo, ni cuando se verifica la presencia de abejas u otros polinizadores en el cultivo a tratar o cultivos aledaños.
- Peligroso para peces y demás organismos acuáticos.
- No contaminar ríos, lagos, estanques, arroyos u otras fuentes de agua con los desechos, restos de la aplicación, sobrantes del producto o envases vacíos.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua, de al menos 5 metros.
- Peligroso para animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.
- En caso de derrames, recoger el producto inmediatamente y depositarlo en sitios destinados por las autoridades locales para este fin.

# PROPIXON®

## PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA FUNGICIDA AGRÍCOLA

### Concentrado Emulsionable (EC)

**COMPOSICIÓN QUÍMICA:**

Propiconazole..... 250 g/L  
Solvesso 150..... 350 g/L  
Aditivos ..... csp 1L

Reg. PQUA N° 779 - SENASA



Titular de Registro:  
Av Benavides 1579. Oficina 702. Edificio Del Park II. Lima 18-Perú.  
Telf.: (01) 253-6444 - atencionalcliente@grupoandina.com.pe

Formulado por:

**OASIS AGROSCIENCE LIMITED**

12/F Lucky Building 39 Wellington Street Central HK. China.

Distribuido por:



Av. Benavides 1579. 7mo piso. Oficina 703.  
Edificio Del Park II. Lima 18 - Perú / Telf.: (01) 253-6444  
atencionalcliente@grupoandina.com.pe

Lote N°:

F. de Form:

F. de Venc:

® Marca registrada



Contenido Neto: 1L

NO CORROSIVO INFLAMABLE NO EXPLOSIVO

### LIGERAMENTE PELIGROSO CUIDADO

**INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO**

**PROPIXON®** es un fungicida sistémico, con acción protectante y curativa. Su modo de acción es inhibir la biosíntesis del ergosterol en las membranas celulares del hongo, causando un desarrollo anormal del hongo, para finalmente causarle la muerte.

**PROPIXON®**, se aplica mediante pulverizaciones con equipos de aspersión terrestre, previa mezcla con agua. Preparar una premezcla de acuerdo a la dosis indicada con la mitad de volumen del agua a utilizar, agitar hasta que el producto este bien disuelto y complementar el volumen de la aplicación.

“CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO”

**CUADRO DE USOS:**

CULTIVO	PLAGAS		DOSIS		P.C. (días)	LMR (ppm)
	Nombre Común	Nombre Técnico	L/cil 200 L	L/ha		
ESPARRAGO	“Cercosporiasis”	<i>Cercospora asparagi</i>	0,2	-	30	0,05
FRIJOL	“Oidiosis”	<i>Erysiphe betae</i>	0,15 -0,2	-	28	0,05
ARROZ	“Pyricularia”	<i>Pyricularia oryzae</i>	-	0,5	23	0,7

LMR: Límite Máximo de Residuos

PC: Periodo de carencia

**FRECUENCIA Y MOMENTO DE APLICACIÓN**

Aplicar sólo 1 vez por campaña, considerando 2 campañas/año, a fin de evitar la resistencia de plagas.  
Aplicar temprano en las mañanas o muy en las tardes. Evitar la deriva por el viento.  
No aplicar en época de floración, por ser muy peligroso para abejas.

**PERIODO DE REINGRESO**

Puede reingresar al área tratada sin usar equipo de protección, 24 horas después de la aplicación.

**FITOTOXICIDAD**

**PROPIXON** no es fitotóxico al cultivo recomendado, si se aplica en los momentos y a la dosis indicada.

**COMPATIBILIDAD**

**PROPIXON** es compatible con la mayoría de productos fitosanitarios de uso común.

**RESPONSABILIDAD CIVIL:**

El titular de registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a la anotada en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.



14.5 cm