

**"LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO"**

- PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN:**
- Este producto es de uso agrícola, no ingerir.
  - No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
  - Conservar este producto en su envase original, etiquetado y cerrado.
  - Almacenar el producto bajo techo en un lugar fresco y ventilado.
  - No usar el envase para conservar alimentos ni agua para consumo.
  - No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, bebidas, medicinas ni forrajes.
  - Después de usar el producto, báñese con abundante agua y jabón, cámbiese y lave la ropa contaminada.
  - Utilizar ropa protectora durante el manipuleo, aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.
  - El producto puede ser nocivo por ingestión e inhalación.
  - Realice la operación de aplicación siguiendo la dirección del viento.

- PRIMEROS AUXILIOS:**
- **Grupo químico: Triazol + Estrobilurina**
  - En caso de intoxicación, lleve al paciente inmediatamente al médico y muéstrela la etiqueta.
  - En caso de ingestión, no provoque el vómito, ni dar beber agua a la persona si está inconsciente.
  - En caso de contacto con los ojos, manténgalos abiertos y lávelos inmediatamente con agua limpia durante 15 minutos.
  - En caso de contacto con la piel, retire la ropa y zapatos y lavar la piel con abundante agua y jabón.
  - En caso de inhalación retirar al paciente a un lugar fresco y aplicar respiración artificial si fuera necesario.

**Nota al médico:** No tiene antídoto, dar tratamiento sintomático.

**TELÉFONOS DE EMERGENCIA:**  
SAMU: 106  
CROP BUSINESS SAC: 349 - 2669 ANEXO: 1005

**MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS:**  
Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe reutilizarse. Después de usar el contenido inutilice la funda o bolsa cortándola. Entreguela o deposítela en el lugar de destino dispuesto por la autoridad competente, para su gestión.

**MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE:**

- Peligroso para peces y demás organismos acuáticos.
- No contaminar lagos, ríos, estanques, arroyos u otras fuentes de agua con los desechos, restos de la aplicación, sobranes del producto o envases vacíos.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua, de al menos 10 metros.
- El producto no debe aplicarse en zonas con napas freáticas superficiales y/o subterráneas.
- Peligroso para animales domésticos, fauna y flora silvestre.
- El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.
- En caso de derrames, recoger el producto inmediatamente y depositarlo en un lugar seguro a fin de evitar su lixiviación.

**INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO:**

**LUXATE 75 WG** es un fungicida sistémico, cuyos componentes activos actúan de manera complementaria, el tebuconazole inhibe la síntesis del ergosterol, mientras que el trifloxystrobin bloquea la respiración celular, logrando la muerte del hongo.

**LUXATE 75 WG** se aplica en aspersión, previa mezcla con agua. Realizar una premezcla en un volumen menor de agua, agitar bien y luego agregar el resto de agua hasta completar el volumen requerido. Usar preferentemente agua con un pH entre 6.8 a 7.5. Aplicar con cualquier equipo convencional que esté en buen estado y debidamente calibrado.

**FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN:**

- Aplicar previa evaluación de la plaga.
- En Cebolla: cuando se encuentre en campo el 5% de hojas afectadas, especialmente en la etapa de engrosamiento del bulbo. En Vid: cuando se observen los primeros síntomas en brotes verdes y cuando encuentre un 20% de brotes afectados.
- En Arroz: cuando se observen los primeros síntomas de la enfermedad, no mayor al 10% de severidad, durante la época de maduramiento y formación del panícula.
- Número máximo de aplicaciones:  
En Cebolla: máximo aplicar 01 aplicación por campaña, considerando 2 aplicaciones.  
En Vid: máximo aplicar 02 aplicaciones por campaña, considerando 1 campaña al año.  
En Arroz: máximo aplicar, 2 aplicaciones por campaña, con un intervalo de 14 días, considerando 2 campañas al año.

**PERIODO DE REINGRESO:**  
Puede ingresar al área tratada, 24 horas después de la aplicación.

**COMPATIBILIDAD:**  
**LUXATE 75 WG** es compatible con la mayoría de plaguicidas de uso común, excepto con aquellas de reacción fuertemente ácidas, alcalinas u oxidantes.

**FITOTOXICIDAD:**  
El producto **LUXATE 75 WG** no es fitotóxico cuando es utilizado según lo indicado en la etiqueta.

**RESPONSABILIDAD CIVIL:**  
El Titular del Registro garantiza que las características fisicoquímicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.

**"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"**

CULTIVO	PLAGA		DOSIS			P.C (días)	P.C (ppm)
	Nombre Común	Nombre Científico	Kg/200 L	Kg/Ha	%		
Cebolla	Punta seca	<i>Stemphylium vesicarium</i>	-	0.3 - 0.5	-	14	0.02
Vid	Oscuridad	<i>Erysiphe necator</i>	-	0.3	0.03	21	2.0*
	Mildiu	<i>Botrytis cinerea</i>	-	0.3 - 0.35	0.03 - 0.035	-	5.0**
Arroz	Particularia	<i>Pyricularia oryzae</i>	-	0.2 - 0.25	-	35	0.02
Café	Mancha del café	<i>Hemileia vastatrix</i>	0.2	-	-	-	0.1*
	Ojo de gallo	<i>Mycena citricolor</i>	0.15 - 0.2	-	-	30	0.05**
Pimiento	Oidium	<i>Leveillula taurica</i>	0.125	0.25	-	7	0.3*

P.C.: Periodo de curación (días) L.M.R.: Límite máximo de residuos (ppm: Partes por millón) \*Tebuconazole \*\*Trifloxystrobin



"MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

# LUXATE 75 WG

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

FUNGICIDA AGRÍCOLA

GRÁNULO DISPERSABLE - WG

**Composición:**  
Tebuconazole ..... 500 g/Kg  
Trifloxystrobin ..... 250 g/Kg  
Aditivos ..... c.s.p 1Kg

Reg PQUA N° 781 - SENASA  
Titular del Registro: CROP BUSINESS S.A.C

Importado y Distribuido por:  
CROP BUSINESS S.A.C.



Av. Melgarejo N° 580, Dpto. 301 Urb. Santa Patricia I Etapa - La Molina  
Teléfono: 349-2669

Fecha de Formulación: Formulado por:  
N° de Lote: SHANGHAI E-TONG CHEMICAL CO., LTD  
Contenido Neto: 100 gr. N° 23, Lane 5398, Shenzhuan Road,  
Fecha de Vencimiento: Songjiang District - Shanghai  
CHINA

NO CORROSIVO NO INFLAMABLE NO EXPLOSIVO

**SEGURIDAD.**

**"LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO"**

- PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN:**
- Este producto es de cuidado, no ingerir.
  - No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
  - Conservar este producto en su envase original, etiquetado y cerrado.
  - Almacenar el producto bajo techo en un lugar fresco y ventilado.
  - No usar el envase para conservar alimentos ni agua para consumo.
  - No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, bebidas, medicinas ni forrajes.
  - Después de usar el producto, báñese con abundante agua y jabón, cámbiese y lave la ropa contaminada.
  - Utilizar ropa protectora durante el manipuleo, aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.
  - El producto puede ser nocivo por ingestión e inhalación.
  - Realice la operación de aplicación siguiendo la dirección del viento.

- PRIMEROS AUXILIOS:**
- **Grupo químico: Triazol + Estrobirulina**
  - En caso de intoxicación, lleve al paciente inmediatamente al médico y muéstrela la etiqueta.
  - En caso de ingestión, no provoque el vómito, ni dar beber agua a la persona si está inconsciente.
  - En caso de contacto con los ojos, manténgalos abiertos y lávelos inmediatamente con agua limpia durante 15 minutos.
  - En caso de contacto con la piel, retire la ropa y zapatos y lavar la piel con abundante agua y jabón.
  - En caso de inhalación retirar al paciente a un lugar fresco y aplicar respiración artificial si fuera necesario.

**Nota al médico:** No tiene antídoto, dar tratamiento sintomático.

**TELÉFONOS DE EMERGENCIA:**  
SAMUJ- 106  
CROP BUSINESS SAC: 349 - 2669 ANEXO: 1005

- MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS:**
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe reutilizarse. Después de usar el contenido inutilice la funda o bolsa cortándola. Entreguela o deposítela en el lugar de destino dispuesto por la autoridad competente, para su gestión.

- MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE:**
- Peligroso para peces y demás organismos acuáticos.
  - No contaminar lagos, ríos, estanques, arroyos u otras fuentes de agua con los desechos, restos de la aplicación, sobranes del producto o envases vacíos.
  - Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua, de al menos 10 metros.
  - El producto no debe aplicarse en zonas con napas freáticas superficiales y/o subterráneas.
  - Peligroso para animales domésticos, fauna y flora silvestre.
  - El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.
  - En caso de derrames, recoger el producto inmediatamente y depositarlo en un lugar seguro a fin de evitar su lixiviación.

- INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO:**
- **LUXATE 75 WG** es un fungicida sistémico, cuyos ingredientes activos actúan de manera complementaria, el tebuconazole inhibe la síntesis del ergosterol, mientras que el trifloxystrobin bloquea la respiración celular, logrando la muerte del hongo.
  - **LUXATE 75 WG** se aplica en aspersión, previa mezcla con agua. Realizar una premezcla en un volumen menor de agua, agitar bien y luego agregar el resto de agua hasta completar el volumen requerido. Usar preferentemente agua con un pH entre 6.8 a 7.5. Aplicar con cualquier equipo convencional teniendo en buen estado y debidamente calibrado.

- FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN:**
- Aplicar previa evaluación de la plaga.
  - En Cebolla: cuando se encuentre en campo el 5% de hojas afectadas, especialmente en la etapa de engrosamiento del bulbo. En Vid: cuando se observen los primeros síntomas en brotes verdes y cuando encuentre un 20% de hojas afectadas.
  - En Arroz: cuando se observen los primeros síntomas de la enfermedad, no mayor al 10% de severidad, durante la época de macollamiento y formación de panícula.
  - Número máximo de aplicaciones: En Cebolla: máximo aplicar 01 aplicación por campaña, considerando 2 campañas al año. En Vid: máximo aplicar 02 aplicaciones por campaña, considerando 1 campaña/año con un volumen de gasto de agua máximo de 1000 litros por hectárea. En Arroz: máximo aplicar, 2 aplicaciones por campaña, con un intervalo de 14 a 16 días, considerando 2 campañas al año. No aplicar **LUXATE 75 WG**, consecutivamente, sino alternar con otro fungicida de diferente modo de acción.

- PERIODO DE REINGRESO:**
- Puede reingresar al área tratada, 24 horas después de la aplicación.

- COMPATIBILIDAD:**
- **LUXATE 75 WG** es compatible con la mayoría de plaguicidas de uso común, excepto con aquellas de reacción fuertemente ácidas, alcalinas u oxidante.

- FITOTOXICIDAD:**
- El producto **LUXATE 75 WG** no es fitotóxico cuando es utilizado según lo indicado en la etiqueta.

- RESPONSABILIDAD CIVIL:**
- El Titular del Registro garantiza que las características fisicoquímicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.

**"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"**

CULTIVO	PLAGA		DOSIS			P.C (días)	P.C (ppm)
	Nombre Común	Nombre Científico	Kg/200 L	Kg/Ha	%		
Cebolla	Punta seca	<i>Stemphylium vesicarium</i>	-	0.3 - 0.5	-	14	0.02
Vid	Botrytis	<i>Erysiphe necator</i>	-	0.3	0.03	21	2.0*
	Mildew	<i>Botrytis cinerea</i>	-	0.3 - 0.35	0.03 - 0.035	-	5.0**
Arroz	Paniculatia	<i>Pyricularia oryzae</i>	-	0.2 - 0.25	-	35	0.02
Café	Mancha del café	<i>Hemileia vastatrix</i>	0.2	-	-	-	0.1*
	Cho de gallo	<i>Mycena citricolor</i>	0.15 - 0.2	-	-	-	0.05**
Pimiento	Oidium	<i>Leveillula taurica</i>	0.125	0.25	-	7	0.3*

P.C.: Periodo de latencia (días) L.M.R.: Límite máximo de residuos (ppm: Partes por millón) \*Tebuconazole \*\*Trifloxystrobin



"MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

# LUXATE 75 WG

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

FUNGICIDA AGRÍCOLA

GRÁNULO DISPERSABLE - WG

- Composición:**
- Tebuconazole ..... 500 g/Kg
  - Trifloxystrobin ..... 250 g/Kg
  - Aditivos ..... c.s.p 1Kg

Reg PQUA N° 781 - SENASA  
Titular del Registro: CROP BUSINESS S.A.C

Importado y Distribuido por:  
CROP BUSINESS S.A.C.



Av. Melgarejo 1580 Dpto. 301 Urb. Santa Patricia I Etapa - La Molina  
Teléfono: 349-2669

- Fecha de Formulación ..... Formulado por:  
N° de Lote: ..... **NANJING RHONQUIM CO., LTD**  
**Contenido Neto: 100 gr.** ..... N° 26 Majia Street, Nanjing Jiangsu, 210009  
Fecha de Vencimiento ..... CHINA

NO CORROSIVO NO INFLAMABLE NO EXPLOSIVO

**SEGURIDAD.**