

# Arranque 90% PS

**INSECTICIDA AGRÍCOLA**

**POLVO SOLUBLE - SP**

**COMPOSICIÓN QUÍMICA:**

Ingrediente activo: Methomyl ..... 900 g/kg  
Ingredientes inertes: ..... 100 g/kg

Reg. PQUA N° 153-SENASA

“VENTA SÓLO POR PRESCRIPCIÓN DE UN INGENIERO AGRÓNOMO”



TITULAR DE REGISTRO  
**Insumos Agrícolas Peruanos S.A.C.**  
Calle Jorge Vanderghen N° 315  
Miraflores  
Lima- Perú

IMPORTADO Y DISTRIBUIDO POR:  
**PERÚ PRODUCTOS AGRÍCOLAS S.A.C.**  
Av. Nicolás Arriola 2374 - San Luis  
Lima - Perú  
Teléfono: 547-0638

FORMULADO POR:  
**Jiangyin Dayo Chemical Co., Ltd.**  
No. 18, Qingtong Rd., Qingyang.  
Jiangyin Jiangsu  
China

CONTENIDO NETO: 1 Kg

Lote N°:  
Fecha de formulación:  
Fecha de vencimiento:

NO CORROSIVO

NO INFLAMABLE

NO EXPLOSIVO



**ALTAMENTE PELIGROSO  
TÓXICO**

**LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO**  
**MANTENGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS**

**PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO**

- Almacenar y transportar en lugar sombreado, seco y ventilado, en sus envases originales y bien cerrados.
- No comer, no beber ni fumar durante y después de la aplicación sin haberse lavado con agua y jabón.
- Evite su almacenamiento y transporte junto a productos alimenticios o medicinas de uso humano o veterinario.
- No contaminar los ríos, lagos o fuentes de agua.
- Usar guantes, máscara, gafas protectoras y mameluco con protector plástico durante la preparación y aplicación del producto.
- Peligroso para peces, abejas y otras formas de vida silvestre.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

**PRIMEROS AUXILIOS**

En caso de intoxicación, llamar al médico. Provocar el vómito si está consciente y luego aplicar tratamiento sintomático y de sostén. Al contacto con la piel y los ojos, lavarlos rápidamente con abundante agua limpia y jabón.

Cuando hay síntomas de intoxicación aplicar sulfato de atropina en forma intravenosa o intramuscular 1 - 2 mg en adultos, repetir si es necesario.

Teléfonos de emergencia:  
 CICOTOX: 0800-1-3040.

**CONDICIONES DE MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS**

Después de usar el contenido coloque este envase en lugares destinados por las autoridades para este fin.

No utilice este envase para guardar alimentos.

**MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE**

En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en el sitio destinado para este fin.

No contaminar las fuentes de agua con los restos de aplicación o sobrantes del producto.

Peligroso para abejas y artrópodos benéficos.

Peligroso para invertebrados acuáticos; no contaminar lagos, ríos, estanques o arroyos con los desechos y envases vacíos.

Peligroso para animales domésticos, flora y fauna silvestre.

No aplicar el producto en suelos con napa freática superficial.

Respetar una banda de protección hacia fuentes de agua de al menos 5 metros.

**LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO**  
**MANTENGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS**

**INDICATIVOS DE USO**

**ARRANQUE 90% PS** es un insecticida carbamato sistémico de amplio espectro de acción.

**PREPARACIÓN Y APLICACIÓN**

Aplicar con cualquier equipo de aspersión, tratando de lograr una cobertura uniforme.

**USO ESPECIFICO DEL PRODUCTO**  
**CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO**

CULTIVOS	NOMBRE DE LA PLAGA		DOSIS		P.C. (Días)	L.M.R. (ppm)
	Técnico	Común	Kg/Ha	G/cil		
Tomate	<i>Spodoptera eridania</i>	Gusano del fruto	0.4	200	7	1
Maiz	<i>Spodoptera frugiperda</i>	Cogollero	0.5-0.6	250-300	7	0.1
Espárrago	<i>Heliothis virescens</i>	Barrenador de brotes	0.4	200	1	2
Pimiento	<i>Symmetrischema capsicum</i>	Gusano del fruto	0.4	200	3	1
Pimiento	<i>Heliothis virescens</i>	Barrenador de brotes	0.4	200	3	1
Cebolla	<i>Thrips tabaci</i>	Trips	0.4 - 0.6	200-300	7	0.2
Alcachofa	<i>Heliothis virescens</i>	Barrenador de brotes	0.4	200	N.d	0.2

P.C.= Periodo de Carencia. L.M.R. = Limite Máximo de Residuos.

**FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN:**

Se recomienda aplicar en cualquier etapa del cultivo. Se recomienda un máximo de 2 aplicaciones por campaña.

**PERIODO DE REINGRESO:**

No entrar a las áreas tratadas durante las primeras 24 horas después de la aplicación.

**COMPATIBILIDAD:**

**ARRANQUE 90% PS** es compatible con plaguicidas de uso común excepto con los de reacción alcalina o los compuestos de cobre.

**FITOTOXICIDAD:**

**ARRANQUE 90% PS** no es fitotóxico a los cultivos indicados en la etiqueta.

**RESPONSABILIDAD CIVIL:**

El titular de registro garantiza que el producto contenido en este envase concuerda con la descripción química indicada en la etiqueta y es apto para su uso siguiendo las instrucciones dadas.

