

Haley®

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

FUNGICIDA AGRÍCOLA

POLVO MOJABLE- WP

Composición:

Hidróxido de Cobre..... 460g/kg
 Cymoxanil.....60 g/kg
 Aditivosc.s.p. 1kg

Reg. N°432-97-AG-SENASA

Titular de Registro: **SERFI S.A.**

Formulado y Distribuido por:



Av. Oscar R. Benavides (ex Diagonal) 380 Of. 701
 Miraflores Lima - PERÚ
 Teléfono: 51 (1) 446-2896

N° de Lote :
 Fecha de Form.:
 Fecha de Venc. :

CONTENIDO NETO: 500 g

NO CORROSIVO NO INFLAMABLE NO EXPLOSIVO

**LIGERAMENTE PELIGROSO
 CUIDADO**

**LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO
 "MANTENGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"**

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación del producto.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación y para ingresar al área tratada las primeras 24 horas.
- Peligroso si es inhalado. Evite respirar el polvo y la aspersión.
- Causa irritación moderada a los ojos.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

PRIMEROS AUXILIOS

- Grupo Químico: Sales de Cobres + Acetamida
- En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente, o lleve el paciente al médico y muéstrela la etiqueta.
- En caso de contacto con los ojos, lavarlos con abundante agua fresca y si el contacto fuese por piel, lavarse con abundante agua y jabón.
- En caso de **EMERGENCIAS** llame a los siguientes teléfonos.

CICOTOX: 0-800-1-30-40 SERFI S.A.: 446-2896

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

Después de usar el contenido, destruya el envase y dépositelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE

- Tóxico para organismos acuáticos.
- No contamine ríos, estanques o arroyos con los desechos y envases vacíos.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 5 metros.
- El operador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.
- En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en el sitio destinado por las autoridades locales para este fin.

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

Haley es un fungicida preventivo y curativo usado en pulverizaciones foliares para el control de los hongos que atacan a los cultivos indicados en el cuadro de Usos y Dosis.

Preparación y Aplicación: **Haley** se prepara diluyendo la dosis indicada en un recipiente previo con agua, luego esta solución se lleva al cilindro o mochila según el vaso y se completa con agua hasta alcanzar el volumen requerido, se agita y se procede a aplicar

CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO

Cultivo	Enfermedad		Dosis		PC (días)	LMR Cymoxanil(*)	LMR Hidróxido de Cobres(**)
	Nombre común	Nombre científico	Kg/200L(*)	Kg/ha			
Ajo	Mildú	<i>Peronospora destructor</i>	0,5	1,0-2,0	3	0,05	5
Cebolla	Mildú	<i>Peronospora destructor</i>	0,5	1,0-2,0	3	0,5	5
Marigold	Mancha de la Hoja	<i>Alternaria</i> sp.	0,5	1,0-2,0	NA	0,05	100
Papa	Hielo o Ranche	<i>Phytophthora infestans</i>	0,5	1,0-2,0	14	0,05	5
Tomate	Hielo o Ranche	<i>Phytophthora infestans</i>	0,5	1,0-2,0	3	0,2	5
Quinua	Mildú	<i>Peronospora farinosa</i>	0,5-0,6	1,2-1,4	14	0,05	10

P.C.: Período de Carenacia

L.M.R.: Límite Máximo de Residuos (ppm: partes por millón)

NA: No Aplica.

(*) En caso de usar bomba de mochila a motor se debe usar 1 kg por cilindro de 200 litros.

(**) Los valores son para la Comunidad Europea, en EEUU el producto está exento de residuos según EPA.

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN

Las aplicaciones pueden repetirse entre los 7 y 14 días. Se puede aplicar en cualquier etapa fenológica del cultivo, hasta 15 días antes de la cosecha.

PERIODO DE REINGRESO

24 horas

COMPATIBILIDAD

Haley es compatible con la mayoría de agroquímicos de uso convencional, evitar productos muy ácidos o alcalinos. Se recomienda hacer una prueba previa de compatibilidad antes de realizar la mezcla.

FITOTOXICIDAD

No se han observado síntomas de fitotoxicidad

RESPONSABILIDAD CIVIL

El Titular del Registro garantiza que las características fisicoquímicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.

