

06.12.21 Tamaño: 16 x 12 cms

MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

Haley®

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

FUNGICIDA AGRÍCOLA

POLVO MOJABLE (WP)

Composición:

Hidróxido de Cobre (expresado como cobre metálico).....460 g/kg
Cymoxanil.....60 g/kg
Aditivosc.s.p. 1kg

Reg. N°432-97-AG-SENASA

Titular de Registro: SERFI S.A.

Formulado y Distribuido por:



Av. República de Panamá 2577
La Victoria, Lima-Perú
Teléfono 51 (1) 710-4068

N° de Lote :
Fecha de Form.:
Fecha de Venc. :

CONTENIDO NETO: 0.5 kg

NO CORROSIVO NO INFLAMABLE NO EXPLOSIVO

LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO

MV PRODUCCIONES GRAFICAS



"LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO"
"MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación del producto.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación y para ingresar al área tratada las primeras 24 horas.
- Peligroso si es inhalado. Evite respirar el polvo y la aspersión.
- Causa irritación moderada a los ojos.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS

- Grupo Químico: Sales de Cobre+ Acetato de Cobre
- En caso de intoxicación llame al médico o médico asistente, o lleve el paciente al médico y muestre la etiqueta.
- En caso de contacto en los ojos lavarlos con abundante agua fresca y si el contacto fue por piel, lavarse con abundante agua y jabón.
- En caso de EMERGENCIAS llame a los siguientes teléfonos:

SERFI S.A.: (01)-7104068

CONDICIONES DE MANEJO Y DE DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe reutilizarse. Después de usar el contenido inutilice la funda o bolsa cortándola. Entréguela o dépositela en el lugar de destino dispuesto por la autoridad competente, para su gestión.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE

- Tóxico para organismos acuáticos.
- No contamine ríos, estanques o arroyos con los desechos y envases vacíos.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 5 metros.
- El operador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.
- En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en el sitio destinado por las autoridades locales para este fin.

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

Haley es un fungicida preventivo y curativo usado en pulverizaciones foliares para el control de los hongos que atacan a los cultivos indicados en el cuadro de Usos y Dosis.

Preparación y Aplicación: Haley se prepara diluyendo la dosis indicada en un recipiente previo con agua, luego esta solución se lleva al cilindro o mochila según el vaso y se combina con agua para alcanzar el volumen requerido, se agita y se pulveriza aplicando.

CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO

Cultivo	Plaga		Dosis		PC (días)	LMR Cymoxanil(*)	LMR Hidróxido de Cobre(**)
	Nombre común	Nombre científico	kg/200L(*)	kg/ha			
Ajo	Mildiu	Peronospora allii	0,5	1,0-2,0	3	0,05	5
Cebolla	Mildiu	Peronospora destructor	0,5	1,0-2,0	3	0,5	5
Mangold	Mancha de la Hoja	Alternaria sp.	0,5	1,0-2,0	NA	0,05	100
Papa	Hielo o Riancha	Phytophthora infestans	0,5	1,0-2,0	14	0,05	5
Tomate	Hielo o Riancha	Phytophthora infestans	0,5	1,0-2,0	3	0,2	5
Quinoa	Mildiu	Peronospora farinosa	0,5-0,6	1,2-1,4	14	0,05	10

PC.: Período de Carencia

L.M.R.: Límite Máximo de Residuos (ppm: partes por millón)

NA: No Aplica.

(*) En caso de usar bomba de mochila a motor se debe usar 1 kg por cilindro de 200 litros.

(**) Los valores son para la Comunidad Europea, en EEUU el producto está exento de residuos según EPA.

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN

Las aplicaciones pueden repetirse entre los 7 y 14 días. Se puede aplicar en cualquier etapa fenológica del cultivo, hasta 15 días antes de la cosecha.

PERIODO DE REINGRESO

24 horas

COMPATIBILIDAD

Haley es compatible con la mayoría de agroquímicos de uso convencional, evitar productos muy ácidos o alcalinos. Se recomienda hacer una prueba previa de compatibilidad antes de realizar la mezcla.

FITOTOXICIDAD

La aplicación de dosis superiores a las señaladas en el cuadro de usos, podrían ocasionar fitotoxicidad en el cultivo. Aplicar solo las dosis señaladas en el cuadro de dosis.

RESPONSABILIDAD CIVIL

El Titular del Registro garantiza que las características fisicoquímicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular de registro o con el distribuidor del producto.



C100 M0 Y0 K0 C78 M2 Y98 K9
C0 M30 Y95 K0 K100