# Opera®

**PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA**

**FUNGICIDA AGRICOLA**

Suspoemulsión (SE)

**COMPOSICIÓN**

Pyraclostrobin ..... 133 g/L
Epoxiconazole ..... 50 g/L
Aditivos ..... c.s.p. 1 L

**Reg. PQUA N° 064 – SENASA**

**TITULAR DEL REGISTRO, IMPORTADO Y DISTRIBUIDO POR:**
**BASF Peruana S.A.**
Av. O. R. Benavides 5915 – Callao.
Casilla 3911, Lima 100
Telf: (01) 513 2500
Fax: (01) 513 2519

BASF
We create chemistry

**FORMULADO POR:**
**BASF S.A.**
Av. Brasil, 791, Bairro
Engenheiro Neiva,
Guaratinguetá SP- Brasil

**Contenido Neto:** **5 L**
N° de Lote:
Fecha de Formulación:
Fecha de Vencimiento:

**NO CORROSIVO** **NO INFLAMABLE** **NO EXPLOSIVO**

**® Marca Registrada BASF SE**

**MODERAMENTE PELIGROSO**
**DAÑINO**

**LEA LA ETIQUETA Y HOJA INFORMATIVA ADJUNTA ANTES DE USAR EL PRODUCTO**
**MANTENGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS**

**PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN**

- **El producto es moderadamente tóxico por ingestión e inhalación y puede causar irritación al aparato respiratorio.**
- **Es irritante a la piel y ligeramente irritante a los ojos.**
- Se sospecha que daña al feto.
- Durante la manipulación y aplicación hacer uso de guantes, mascara respiradora y lentes protectores y para ingresar al área tratada durante las primeras 24 horas.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Conserve el producto en envase original, etiquetado y cerrado.
- Después de usar el producto, cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- No almacenar en casas habitación. No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas, ni forrajes.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.
- Usar solamente el producto que viene en envase original.
- Conserve el producto sobrante en su envase original, bien cerrado.

**TELEFONO PARA EMERGENCIAS TOXICOLÓGICAS**
**CICOTOX: 0800-1-3040**
**CISPROQUIM 0800-5-0847**
**ESSALUD: 107 ó 411 8000**
**BASF Peruana S.A.: 513 2505**

**INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO**

- **Opera** es un producto con doble modo de acción en los hongos: inhibe la biosíntesis de ergosterol a nivel de las membranas celulares y la síntesis de ATP en la mitocondria, procesos esenciales para el desarrollo de los hongos. Por su distribución en la planta: actúa inhibiendo la germinación de las esporas y el desarrollo de los tubos germinativos en la parte externa de los tejidos por acción de pyraclostrobin (contacto) y una vez dentro de los tejidos se inhibe el desarrollo del hongo por acción de epoxiconazole (sistémico).
- Agitar bien el envase de Opera antes de usar. Se aplica en solución con agua. Llenar el tanque o cilindro hasta un tercio de su capacidad con agua, agregar la dosis recomendada, completar con agua y agitar hasta lograr una mezcla homogénea. Agitar la mezcla antes de llenar los equipos de aplicación.

**RESPONSABILIDAD CIVIL:**

"El titular del Registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas"