

Glifolaq® 36 SL

HERBICIDA AGRÍCOLA

CONCENTRADO SOLUBLE (SL)

COMPOSICIÓN:

Glyphosate Isopropylamine Salt 480 g/l
Aditivos 640 g/l

PQUA N° 501 - SENASA

TITULAR DEL REGISTRO:

AGRIPAC PERÚ SAC

Av. José Pardo 223 INT. 41 - Miraflores - Perú
Teléfono: 444 - 3663

FORMULADOR:

AGRIPAC S.A.

Kilómetro 5.5 vía Durán - Tambo. Durán - Ecuador
PBX: 593-42808262 FAX: 593-42807279

IMPORTADOR Y DISTRIBUIDOR:

AGRIPAC PERÚ SAC

Av. José Pardo 223 INT. 41 - Miraflores - Perú
Teléfono: 444 - 3663:

Contenido Neto: 20 Litros

Fecha de Formulación:

N° de Lote:

Fecha de Vencimiento:



CORROSIVO

NO INFLAMABLE

NO EXPLOSIVO



LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO

"LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO" "MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN:

- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con medicinas, bebidas ni forrajes.
- Utilice ropa protectora durante el mezclado, aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.
- Después de usar el producto, cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.

INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS:

- En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente, o lleve al paciente al médico y muéstrele la etiqueta.
 - En caso de contacto con los ojos, lavarlos con abundante agua limpia, fresca y si el contacto fuese con la piel, lavarse con abundante agua y jabón.
 - En caso de emergencia llamar al 3287398 CICOTOX - INFOSALUD 0800-10-828.
- Nota al médico:
Glifolaq® 36 SL no tiene antídoto específico, seguir tratamiento sintomático.

CONDICIONES DE MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS:

- Después de usar el producto, enjuague 3 veces el envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación, y luego inutilícelo, triturándolo o perforándolo y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase. Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE:

- No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 5 metros.
- En caso de derrame recoger el producto y el material contaminado, depositarlo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin.

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO:

- **Glifolaq® 36 SL** es un herbicida post-emergente de acción sistémica no selectivo para el control de malezas anuales y perennes.
- Agite bien el envase antes de usar el producto.
- Evite que la aspersión moje las paredes del cultivo.
- Se emplea diluido en agua empleándose la proporción indicada en el cuadro de uso.
- No guardar la mezcla preparada para usarlo en días posteriores.

"CONSULTE CON UN AGRÓNOMO O INGENIERO AGRÓNOMO"

Cultivo	Malezas		DOSIS Lt / cil	PC (Días)	LMR (ppm)
	Nombre común	Nombre científico			
Caña de azúcar	"Rabo de zorro"	<i>Setaria verticillata</i>	2 - 3 Lt/cil	NP	2.0
	"Coquiño"	<i>Cyperus rotundus</i>			
	"Griñalote"	<i>Panicum purpurascens</i>			
Arroz	"Pajilla"	<i>Leptochloa filiformis</i>	0.1		
	"Moco de pavo"	<i>Echinochloa crusgalli</i>			
Mandarina	"Botánico"	<i>Eclipta alba</i>	2 - 3 Lt/cil	NP	0.5
	"Gramma dulce"	<i>Cynodon dactylon</i>			
	"Gramma china"	<i>Sorghum halapense</i>			
	"Lechera"	<i>Euphorbia spp.</i>			
	"Verdolaga"	<i>Portulaca oleracea</i>			
	"Rabo de zorro"	<i>Setaria verticillata</i>			
	"Chamico"	<i>Datura stramonium</i>			
	"Cadiño"	<i>Cenchrus echinatus</i>			
	"Pata de gallina"	<i>Elettaria indica</i>			
	"Amor seco"	<i>Bidens pilosa</i>			
Vid	"Capiñal cimarrón"	<i>Nicanandra physaloides</i>	0.5		
	"Verdolaga"	<i>Portulaca oleracea</i>			
Espárrago	"Amor seco"	<i>Bidens pilosa</i>	0.5		
	"Capiñal cimarrón"	<i>Nicanandra physaloides</i>			
	"Coquiño"	<i>Cyperus rotundus</i>			
	"Gramma china"	<i>Sorghum halapense</i>			
	"Rabo de zorro"	<i>Setaria verticillata</i>			
"Pata de gallina"	<i>Elettaria indica</i>				

PC: Período de carencia LMR: Límite máximo de residuos

N.P.: No procede, es un herbicida que no se aplica sobre los cultivos

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN: La frecuencia depende del cultivo y del manejo de riesgo. Se aplica en plena época de mayor actividad fisiológica de las malezas.

PERÍODO DE REENTRADA (REINGRESO): 24 horas después de la aplicación.

COMPATIBILIDAD: Es incompatible con herbicidas residuales como áreas sustituidas, triazinas u otros herbicidas de tipo hormonal, como bipiridilos, fenoxis, organoarsénicos, etc.

FITOTOXICIDAD: No se ha observado fitotoxicidad sobre los cultivos tratados cuando se emplean las medidas agronómicas adecuadas.

RESPONSABILIDAD CIVIL: El titular del registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo a las condiciones e instrucciones dadas.

