

"LEA CUIDADOSAMENTE ESTA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO"
"MANTÉNGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- Este producto puede ser mortal si se ingiere (Cl50 oral en ratas: 812 mg/kg pc).
- Este producto es peligroso si es inhalado. Evite respirar (polvo, vapor o aspersión).
- Este producto causa daño temporal a los ojos. Evite la exposición ocular.
- El ingrediente abamectina puede causar daños al feto. Evite la exposición de gestantes.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con personas, animales, alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicaciones.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo, aplicación y para reingresar al área tratada en las primeras 24 horas.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.

PRIMEROS AUXILIOS

Grupo Químico: Avermectinas

- En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente o lleve al paciente al médico y muéstrela la etiqueta.
- En caso de contacto con los ojos, lavarlos con abundante agua durante al menos 15 minutos y si el contacto fuese con la piel, retirar la ropa contaminada y lavarse con abundante agua y jabón.
- En caso de ingestión no provocar el vómito. Trasladar inmediatamente al paciente a un centro de salud.
- En caso de inhalación colocar a la persona en un sitio con aire fresco y monitorear que no exista dificultad respiratoria, si existe practicar respiración artificial.
- En caso de emergencia llamar a **CICOTOX: 328- 7398**
- Nota al médico: Verlaq 1.8 EC** no tiene antídoto. Tratar sintomáticamente.

CONDICIONES DE MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

- Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación luego inutilícelo triturándolo o perforándolo, y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.
- No reutilizar los envases para conservar alimentos, agua potable o cualquier otra clase de bebidas.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio.



MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE

- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- En caso de derrame recoger el producto y el material contaminado depositarlo en el sitio destinado por las autoridades locales para este fin.
- Peligroso para organismos acuáticos.
- Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de por lo menos de 5 metros.
- El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.

Verlaq® 1.8 EC

INSECTICIDA - ACARICIDA AGRÍCOLA

Concentrado Emulsionable - EC

COMPOSICIÓN QUÍMICA:

Abamectin.....	18 g/L
Aditivos.....	982 g/L
Total.....	1000 g/L

PQUA N° 777-SENASA

Titular de Registro:

AGRIPAC PERU SAC

Av. JOSE PARDO 223 INT. 41 - Miraflores - Perú

Teléfono: 444 - 3663

Formulado por:

Agripac S.A

Kilometro 5.5 Via Duran - Tambo Guayaquil - Ecuador

PBX: 593-4-2808262 / Fax: 593-4-2807279

Importado por:

AGRIPAC PERU SAC

Av. JOSE PARDO 223 INT. 41 - Miraflores - Perú

Teléfono: 444 - 3663

Lote N°:

F. de Form:

F. de Venc:

Contenido Neto: 1L

® Marca registrada



INFLAMABLE

NO CORROSIVO



NO EXPLOSIVO

MODERADAMENTE PELIGROSO
DAÑINO



INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

Verlaq® 1.8 EC se emplea diluido en agua en las proporciones que se indican en el cuadro de uso.

El equipo a utilizarse en la aplicación deben encontrarse en buen estado de funcionamiento. Debe mojarse bien las plantas a tratar considerando que su acción por contacto e ingestión.

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

CUADRO DE USOS:

CULTIVO	PLAGAS		DOSIS (L/Cil)	P.C. (días)	LMR (ppm)
	Nombre Común	Nombre Científico			
Papa	"Mosca blanca"	<i>Liriomyza huidobrensis</i>	0.1	15	0.01
	"Acaro hialino"	<i>Polyphagotarsonemus latus</i>	0.150		
Mandarina	"Minadora de hoja"	<i>Phyllocnistis citrella</i>	0.1	15	0.01
Naranja	"Acaro tostador"	<i>Phyllocoptruta oleivora</i>	0.1	15	0.01
Fresa	"Arañita roja"	<i>Tetranychus spp.</i>	0.2	15	0.02
Apio	"Mosca minadora"	<i>Liriomyza huidobrensis</i>	0.1	15	0.01
	"Acaro hialino"	<i>Polyphagotarsonemus latus</i>	0.15		
Clavel	"Arañita roja"	<i>Tetranychus spp.</i>	0.15	15	0.01
Alcachofa	"Mosca minadora"	<i>Liriomyza huidobrensis</i>	0.20-0.3	15	0.01
Páprika	"Acaro hialino"	<i>Polyphagotarsonemus latus</i>	0.20-0.40	15	0.02

LMR: Límite Máximo de Residuos

PC: Periodo de carencia

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN

Número de aplicaciones: se realizará una (1) aplicación por campaña por hectárea para todos los cultivos.

Verlaq® 1.8 EC debe aplicarse tan pronto como se observen los primeros estadios larvales o ninfales de la plaga a controlar, repetir la aplicación tan pronto se observe la reinfestación.

PERIODO DE REINGRESO

No ingrese a las áreas tratadas antes de las 24 horas de la aplicación.

INCOMPATIBILIDAD

El principio **Verlaq® 1.8 EC** puede ser mezclado con la mayoría de los plaguicidas de uso común. Sin embargo, en caso de duda se recomienda efectuar una prueba de compatibilidad física.

FITOTOXICIDAD

Verlaq® 1.8 EC aplicado de acuerdo a las indicaciones que se dan no presenta problemas de fitotoxicidad en los cultivos, por lo que se recomienda su uso.

RESPONSABILIDAD CIVIL:

El titular de registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a la anotada en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.

