

LEER ESTA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO

“MANTENGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS”

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Conservar el producto en su envase original, etiquetado y cerrado.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con personas, animales, alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo, aplicación y para reingresar al área tratada en las primeras 24 horas.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.

PRIMEROS AUXILIOS

- En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente, o lleve al paciente al médico y muéstrele esta etiqueta.
- En caso de contacto con los ojos, lavarlos con abundante agua limpia, fresca y si el contacto fuese con la piel, lavarse con abundante agua y jabón.
- En caso de emergencia llamar al Teléfono CICOTOX 0800-13040.

NOTA AL MÉDICO

- **Ridodur 40 SC** no tiene antídoto específico, aplicar terapia sintomática.

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACIOS

- 1.- Después de usar el producto, enjuague 3 veces el envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación, y luego inutilícelo, triturándolo o perforándolo y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.
- 2.- Realizar obligatoriamente el Triple Lavado del presente envase.
- 3.- Devuelva el envase Triple Lavado al centro de acopio autorizado.



MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE

- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- En caso de derrame recoger el producto y el material contaminado depositarlo en el sitio destinado por las autoridades locales para este fin.
- Peligroso para peces.
- Peligroso para animales de sangre caliente.

# Ridodur® 40 SC

## Suspensión Concentrada (SC)

### FUNGICIDA AGRÍCOLA

COMPOSICIÓN:

Mancozeb ..... 400 g/l  
 Aditivos c.s.p. .... 1 L  
**Registro N° : 837-99-AG-SENASA**

**Titular de Registro:**  
**AGRIPAC PERU SAC**  
 Av. JOSE PARDO 223 INT. 41 - Miraflores - Perú  
 Teléfono: 444 - 3663

**FORMULADO POR :** AGRIPAC S.A.

Kilometro 5.5 Via Duran - Tambo Guayaquil -Ecuador  
 PBX: 593-4-2808262 FAX: 593-4-2807279

**IMPORTADO Y DISTRIBUIDO POR:**

**BIOGROW PERU S.A.C.**  
 Guillermo Peratta # 394- 109  
 Santiago de Surco, Lima, Peru  
 Teléfonos : 00-51-1-4480298 /00-51-1-9462060295



**CONTENIDO NETO: 1 Litro**

Fecha de Formulación:  
 N° de Lote:  
 Fecha de vencimiento:

**NO CORROSIVO**

**NO INFLAMABLE**

**NO EXPLOSIVO**



**LIGERAMENTE PELIGROSO**  
**CUIDADO**



- INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO:**
- Se emplea diluido en agua empleándose la proporción indicada en el cuadro de dosificación
  - No guardar la mezcla preparada para usarlo en días posteriores.
  - Agítese bien antes de usar el producto manteniendo bien cerrado el envase.
- “CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO”**
- CUADRO DE USOS**

Cultivo	Enfermedades		Dosis %	Dosis L/ltl	P.C. (Días)	L.M.R. (ppm)
	Nombre Común	Nombre Científico				
Papa	"Halo fungoso"	<i>Phytophthora infestans</i>	0,6	-	15	1
Algodón	"Mancha negra de las hojas"	<i>Alternaria alternata</i>	0,6	-	15	4
Cebolla Ajo	"Mildiu vellosa"	<i>Peronospora destructor</i>	0,6	-	15	1
Ají	"Cercosporiasis"	<i>Cercospora capsici</i>	0,6	-	15	1
Trigo	"Oídio"	<i>Oidium spp.</i>	0,6	-	15	2
Melón	"Mildiu"	<i>Pseudoperonospora cubensis</i>	0,6	-	15	1
Arroz	"Mancha lineal" "Mancha circular"	<i>Cercospora oryzae</i> <i>Helminthosporium sp.</i>	0,6	-	15	2
Paprika	"Podrión Gris"	<i>Botrytis cinerea</i>	0,5	-	15	1
Alcachofa	"Alternariosis"	<i>Alternaria sp.</i>	0,5	-	15	1
Espárrago	"Cercospora"	<i>Cercospora asparagi</i>	0,5	0,75-1,2	15	0,1

PC: Período de Carencia L.M.R.: Límite Máximo de Residuos

**FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN:**

Iniciar la aplicación preventivamente cuando las condiciones climáticas amenace la incidencia de la enfermedad, o tan pronto como se observen los síntomas iniciales de la enfermedad. Repetir las aplicaciones de acuerdo a la incidencia y/o presión de la enfermedad.

**PERIODO DE REINGRESO:** Se recomienda no antes de las 24 horas de realizada la aplicación.

**COMPATIBILIDAD:** Ridodur 40 SC Es compatible con la mayoría de los plaguicidas mas comunmente usado. Sin embargo en caso de duda se recomienda efectuar una prueba de compatibilidad física.

**FITOTOXICIDAD:** Ridodur 40 SC aplicado de acuerdo a las indicaciones que se dan no presenta problema de fitotoxicidad en los cultivos en los que se recomienda su uso. No se ha observado fitotoxicidad sobre los cultivos tratados cuando se emplean las medidas agronomicas adecuadas.

**RESPONSABILIDAD CIVIL:** El titular de registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.

“LEA LA ETIQUETA Y LA HOJA INFORMATIVA  
 ANTES USAR EL PRODUCTO”  
 “MANTENGASE BAJO LLAVE FUERA  
 DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS”

“Utilice ropa protectora durante el manipuleo y  
 aplicación para ingresar al área tratada en las  
 primas 24 horas”.

“En caso de intoxicación llame al medico  
 inmediatamente, o lleve al paciente al medico y  
 muestrele la etiqueta y la Hoja Informativa adjunta”

**TELÉFONOS DE EMERGENCIA:**  
**CICOTOX:** 0800 - 13040 **ESSALUD:** 0801 -  
 10200 (ó 107)  
**CIPROSQUIM:** 0800 - 5- 0847 **BIOGROW**  
**PERU SAC:** (01) 4480298

# Ridodur® 40 SC

Suspensión Concentrada (SC)

FUNGICIDA AGRÍCOLA

COMPOSICIÓN:

Mancozeb ..... 400 g/l  
 Aditivos c.s.p. .... 1 L

Registro N° : 837-99-AG-SENASA

**Titular de Registro:**  
**AGRIPAC PERU SAC**  
 Av. JOSE PARDO 223 INT. 41 - Miraflores - Perú  
 Teléfono: 444 - 3663

**FORMULADO POR : AGRIPAC S.A.**  
 Kilometro 5,5 Via Duran - Tambo Guayaquil - Ecuador  
 PBX: 593-4-2808262 FAX: 593-4-2807279

**IMPORTADO Y DISTRIBUIDO POR:**

**BIOGROW PERU S.A.C.**  
 Guillermo Peratta # 394- 109  
 Santiago de Surco, Lima, Perú  
 Telefonos : 00-51-1-4480298 /00-51-1-9462060295

**CONTENIDO NETO: 250 ml**

Fecha de Formulación:  
 N° de Lote:  
 Fecha de vencimiento:

NO CORROSIVO NO INFLAMABLE NO EXPLOSIVO



BioGrow




## CUADRO DE USOS

Cultivo	Enfermedades		Dosis %	Dosis L/cil	P.C. (Días)	L.M.R. (ppm)
	Nombre Común	Nombre Científico				
Papa	"Hielo fungoso"	<i>Phytophthora infestans</i>	0,6	-	15	1
Algodón	"Mancha negra de las hojas"	<i>Alternaria alternata</i>	0,6	-	15	4
Cebolla Ajo	"Mildiu vellosa"	<i>Peronospora destructor</i>	0,6	-	15	1
Ají	"Cercosporiasis"	<i>Cercospora capsici</i>	0,6	-	15	1
Trigo	"Oídio"	<i>Oidium spp.</i>	0,6	-	15	2
Melón	"Mildiu"	<i>Pseudoperonospora cubensis</i>	0,6	-	15	1
Arroz	"Mancha lineal" "Mancha circular"	<i>Cercospora oryzae</i> <i>Helminthosporium sp.</i>	0,6	-	15	2
Páprika	"Podridon Gris"	<i>Botrytis cinerea</i>	0,5	-	15	1
Alcachofa	"Alternariosis"	<i>Alternaria sp.</i>	0,5	-	15	1
Esparrago	"Cercospora"	<i>Cercospora asparagi</i>	-	0,75-1,2	15	0,1

PC: Período de Carencia L.M.R.: Límite Máximo de Residuos

### RESPONSABILIDAD CIVIL:

El titular de registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a la anotada en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.



LIGERAMENTE PELIGROSO  
 CUIDADO

