

**LEA CUIDADOSAMENTE ESTA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO  
"MANTÉNGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"**

**PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN :**

- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- Después de usar el producto, cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación y para ingresar al área tratada durante las primeras 24 horas.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas, ni forrajes.
- Reslizar la aplicación siguiendo la dirección del viento.

**PRIMEROS AUXILIOS:**

**- Grupo Químico: Dinitroanilina**

- En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente, o lleve al paciente al médico y muéstrele la etiqueta.
- En caso de contacto con los ojos, lavarlos con abundante agua fresca y si el contacto fuera con la piel, lavarse con abundante agua y jabón.
- No dar de beber nada a un paciente que se encuentre inconsciente.

**TELÉFONOS DE EMERGENCIA:**

**CICOTOX: 0800 - 1 - 3040**

**NEO AGRUM SAC: 617-6400**

- No se conoce antídoto específico. Siga tratamiento sintomático.

**MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS:**

- Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo triturándolo o perforándolo y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado



**MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE:**

- Peligroso para los peces; no contaminar lagos, ríos, estanques o arroyos con los desechos y envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 5 metros.
- Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre.
- El aplicador deberá emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.
- En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en el sitio destinado por las autoridades para tal fin.

# SCAR<sup>400</sup> EC

## HERBICIDA AGRÍCOLA

### CONCENTRADO EMULSIONABLE - EC

**COMPOSICIÓN:**

Pendimethalin ..... 400 g/L  
Aditivos c.s.p..... 1 L

**Reg. PQUA N° 238 - SENASA**

**Titular del Registro, Importado y Distribuido por:  
NEO AG SAC**

**Calle Meliton Porras 392, Miraflores - Lima  
Teléfono: 617-6400 / Fax: 617-6401**

**Contenido neto: 9 L**

N° de Lote:

F. de Form.:

F. de Venc.:

Fabricado y Formulado por:

SINOCHEM NINGBO LTD

21 Jiangxia St. Ningbo 315000

CHINA

**NO CORROSIVO**

**NO INFLAMABLE**

**NO EXPLOSIVO**

**INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO:**

**SCAR 400 EC** es un herbicida selectivo que puede ser absorbido por raíces y hojas. Actúa inhibiendo la división celular durante la mitosis en los meristemas de tallos y raíces. Su uso es recomendado para el control de malezas gramíneas anuales y de hoja ancha en diversos cultivos.

**SCAR 400 EC** debe ser aplicado sobre suelo húmedo en pre-emergencia de las malezas. Puede ser aplicado con pulverizadoras manuales de palanca (mochilas o equipos accionadores por tractores)

Preparación de la mezcla: Llenar el tanque o cilindro hasta un tercio de sus capacidad con agua, agregar la dosis recomendada de **SCAR 400 EC** y completar con agua agitando constantemente hasta lograr una emulsión.

**"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"**

**CUADRO DE USOS:**

CULTIVO	MALEZAS		Dosis		P.C. (Días)	L.M.R. (ppm)
	Nombre Común	Nombre Técnico	L /200 L	L / ha		
Caña de azúcar	Verdolaga Hierba gallinazo Cardosanto Rabo de zorro Pata de gallina Capulí cimarrón	Portulaca oleracea Chenopodium murale Argemone mexicana Setaria verticillata Eleusine indica Physalis peruviana	1.25	2.5	N.D.	0.1
Cebolla	Quinua Pata de gallina Yuyo o Bledo Leptocloa Cardosanto	Chenopodium spp. Eleusine indica Amaranthus caudatus Leptochloa filiformis Argemone mexicana	2.0	4.0	60	0.1
Alcachofa	Verdolaga Yuyo Hierba mora Capulí	Portulaca oleracea Amaranthus caudatus Solanum nigrum Nicandra physalodes	1.5	3.0	N.D.	0.05

P.C.: Periodo de carencia L.M.R.: Límites máximos de residuos N.D.: No determinado

**FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACION:** En cultivos de siembra directa aplicar **SCAR 400 EC** inmediatamente después de la siembra. En cultivos de transplante aplicar **SCAR 400 EC** en pre-transplante. Realizar máximo una aplicación.

**PERIODO DE REINGRESO:** No reingresar al campo tratado antes de 24 horas de realizada la aplicación.

**COMPATIBILIDAD:** Es compatible con los plaguicidas de uso frecuente excepto con aquellos de reacción alcalina.

**FITOTOXICIDAD:** **SCAR 400 EC** no es fitotóxico si se aplica en los momentos y dosis recomendados.

**RESPONSABILIDAD CIVIL:** El Titular del Registro garantiza que las características físico-químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.



**LIGERAMENTE PELIGROSO  
CUIDADO**

