"LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA Y LA HOJA INFORMATIVA ADJUNTA ANTES DE USAR EL PRODUCTO"
"MANTÉNGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN:

Evitar el contacto con los ojos, la piel y la ropa.
Evitar respirar polvos o inhalar, es ligeramente peligroso.
Causa irritación moderada a los ojos.
No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
Guardar este producto en su envase original, etiquetado y cerrado.
•No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, bebidas, medicinas ni forrajes.
• Utilizar ropa protectora durante el manipuleo, aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.
• Después de usar el producto, báñese con abundante agua y jabón, cámbiese y lave la ropa contaminada.
• Realice la operación de aplicación siguiendo la dirección del viento.
•Después de la mezcla y aplicación, lavarse y cambiarse de ropa y lavarla antes de volver a usarla.

PRIMEROS AUXILIOS

• Grupo químico: Carbamatos
• En caso de ingestión, no administrar nada por vía oral si la persona está inconsciente, no inducir al vómito.
• En caso de contacto con los ojos: levantar los parpados y lavar los ojos con abundante agua y jabón.
•En caso de contacto con la piel; retirar la ropa contaminada y lavar la piel con abundante agua y jabón por 20 minutos.
•En caso de inhalación: Mantener a la persona al aire libre, brindar respiración artificial si fuera necesario, llamar al médico.
•Tratamiento médico: Administrar Sulfato de Atropina por vía intravenosa o vía intramuscular.

NOTA AL MÉDICO

•Antídoto: Sulfato de atropina.
•Administrar 2.1 mg de sulfato de atropina vía intravenosa o intramuscular para adultos. Repetir la dosis en 10 intervalos de 30 minutos hasta que los síntomas se alivien.
En niños (menores de 13 años) administrar 0.05 mg/kg de sulfato de atropina y repetir cada 15-30 minutos hasta que se logre la completa atropinización.

TELÉFONOS DE EMERGENCIA:

CICOTOX : 0800-1-3040 BIOAGROCORP TRADING SAC : 478-2002
ESSALUD:080-10200

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

•Después de utilizar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación, luego inutilícelo,triturándolo o perforándolo y deposítelo en un lugar destinado por las autoridades locales para este fin.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE:

•Altamente peligroso para abejas
• Peligroso para organismos acuáticos.
• No contaminar lagos, ríos, estanques o acequias con los desechos y envases vacíos.
•Peligroso para los animales domésticos, aves, fauna y flora silvestre.
•No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
•Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 5 metros.
•En caso de derrame, recoger el producto y depositarlo en el sitio destinado por las autoridades locales para este fin.
• El producto no debe aplicarse en zonas con napas freáticas superficiales ó de suelos altamente permeables.

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO:

- **LANNACROP 90 SP** es un insecticida sistémico de amplio espectro que actúa por contacto e ingestión.
- **LANNACROP 90 SP** controla eficientemente insectos picadores chupadores y larvas comedoras de follaje.
- **LANNACROP 90 SP** puede ser aplicado con equipos convencionales terrestres con mochilas a palanca, a motor, tecnomas, parihuelas, etc.

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN

• Iniciar la aplicación de **LANNACROP 90 SP** cuando se observen los primeros indicios del ataque de la plaga.
• Toda aplicación debe ser posterior a una evaluación rigurosa del cultivo, el nivel de daño dependerá de la interacción plaga-cultivo.
• Se recomienda hasta un máximo de 2 aplicaciones por campaña..
•Rotar con plaguicidas de diferente grupo químico entre aplicaciones.

PERIODO DE REINGRESO

Puede reingresar sin equipo de protección 48 horas después de aplicado el producto.

COMPATIBILIDAD

LANNACROP 90 SP es compatible con la mayoría de plaguicidas de uso común excepto con aquellas de reacción fuertemente alcalina u oxidante.

FITOTOXICIDAD

El producto no es fitotóxico cuando es utilizado según las indicaciones de la etiqueta.

RESPONSABILIDAD CIVIL

El Titular del Registro garantiza que las características fisicoquímicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomiendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRONÓMO"

CUADRO DE USOS:

CULTIVO	PLAGA		DOSIS		P.C. (días)	LMR (ppm)
	Nombre Común	Nombre Técnico	kg /200 L	kg /ha		
ESPÁRRAGO	"Barrenador de brotes"	*Hellothis virescens*	0.2	0.4	1	2.0
TOMATE	"Gusano ejército"	*Spodoptera eridania*	0.2	0.4	2	0.5

LMR: Límite Máximo de Residuos P.C.: Periodo de Carencia

LANNACROP 90 SP

INSECTICIDA AGRICOLA

POLVO SOLUBLE - SP

COMPOSICIÓN QUÍMICA:

Metomyl	_____	900 g/kg
Aditivos	_____	c.s.p. 1 kg

"VENTA SÓLO POR PRESCRIPCIÓN DE UN INGENIERO AGRÓNOMO"

Reg. PQUA Nº 775 - SENASA
Titular del Registro: BIOAGROCORP TRADING SAC

Importado y Distribuido por:

BIOAGROCORP

Calle Los Flamencos Nº 121 Interior 6 - Santa Anita
Teléfono: 478-2002 / Fax: 362-0014

Contenido neto: 1 Kg.

Nº Lote :
F. de Form.:
F. de Venc.:

Formulado por:
ZHEJIANG E-TONG CHEMICAL CO. LTD.
Room 1213 Building C, Green Land Technology Square
N° 1, Lane 58, East Xinjian Roud, Minhang. Shanghai
CHINA

NO CORROSIVO **NO INFLAMABLE** **NO EXPLOSIVO**

ALTAMENTE PELIGROSO
TÓXICO