

17 cm

20.5 cm

13 cm

20.5 cm

13 cm

# LANNACROP 90 SP

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

INSECTICIDA AGRICOLA  
POLVO SOLUBLE - SP

#### COMPOSICIÓN:

Methomyl 900 g/kg  
Aditivos c.s.p. 1kg

Reg. PQUA N° 775 - SENASA  
"VENTA SÓLO POR PRESCRIPCIÓN DE UN INGENIERO AGRÓNOMO"  
Titular del Registro: CROP BUSINESS S.A.C.

Importado y Distribuido por:  
**CROP BUSINESS S.A.C.**  
*Asegura tu Inversión*  
Calle Toledo N° 161 Dpto. 201 Urbanización  
Mayorazgo IV Etapa - ATE - LIMA  
Teléfono: 349-2669

Formulado por:  
SHANGHAI E-TONG CHEMICAL CO. LTD.  
N° 23, Lane 5398, Shenzhuan Road  
Songjiang District - Shanghai  
CHINA

Fecha de Formulación:  
N° de Lote:  
Contenido Neto: 1 Kg  
Fecha de Vencimiento:

NO CORROSIVO

NO INFLAMABLE

NO EXPLOSIVO



ALTAMENTE PELIGROSO  
TÓXICO

#### "LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA Y LA HOJA INFORMATIVA ADJUNTA ANTES DE USAR EL PRODUCTO"

#### "MANTENGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

#### PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN:

- Evitar el contacto con los ojos, la piel y la ropa.
- Evitar respirar polvos o inhalar, es ligeramente peligroso.
- Causa irritación moderada a los ojos.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Guardar este producto en su envase original, etiquetado y cerrado.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, bebidas, medicinas ni forrajes.
- Utilizar ropa protectora durante el manipuleo, aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.
- Después de usar el producto, báñese con abundante agua y jabón, cámbiese y lave la ropa contaminada.
- Realice la operación de aplicación siguiendo la dirección del viento.
- Después de la mezcla y aplicación, lavarse y cambiarse de ropa y lavarla antes de volver a usarla.

#### PRIMEROS AUXILIOS

- Grupo químico: Carbamatos.
- En caso de ingestión, no administrar nada por vía oral si la persona está inconsciente, no inducir al vómito.
- En caso de contacto con los ojos: levantar los párpados y lavar los ojos con abundante agua y jabón.
- En caso de contacto con la piel: retirar la ropa contaminada y lavar la piel con abundante agua y jabón por 20 minutos.
- En caso de inhalación: Mantener a la persona al aire libre, brindar respiración artificial si fuera necesario, llamar al médico.
- Tratamiento médico: Administrar Sulfato de Atropina por vía intravenosa o vía intramuscular.

#### NOTA AL MÉDICO

- Antídoto: Sulfato de atropina.
- Administrar 2.1 mg de sulfato de atropina vía intravenosa o intramuscular para adultos. Repetir la dosis en 10 intervalos de 30 minutos hasta que los síntomas se alivien.
- En niños (menores de 13 años) administrar 0.05 mg/kg de sulfato de atropina y repetir cada 15-30 minutos hasta que se logre la completa atropinización.

#### TELÉFONOS DE EMERGENCIA:

CICOTOX : 0800-1-3040 CROP BUSINESS SAC : 349-2669  
ESSALUD:080-10200

#### MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

- Después de usar el contenido, destruya este envase y deposítelo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin.

#### MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE:

- Altamente peligroso para abejas.
- Peligroso para organismos acuáticos.
- No contaminar lagos, ríos, estanques o acequias con los desechos y envases vacíos.
- Peligroso para los animales domésticos, aves, fauna y flora silvestre.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 5 metros.
- En caso de derrame, recoger el producto y depositarlo en el sitio destinado por las autoridades locales para este fin.
- El producto no debe aplicarse en zonas con napas freáticas superficiales o de suelos altamente permeables.

#### "CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

| CULTIVO   | PLAGA                |                       | DOSIS     |         | P.C.<br>(días) | LMR<br>(ppm) |
|-----------|----------------------|-----------------------|-----------|---------|----------------|--------------|
|           | Nombre Común         | Nombre Técnico        | kg /200 L | kg /ha  |                |              |
| ESPARRAGO | Barrenador de brotes | Heliothis virescens   | 0.2       | 0.4     | 1              | 2.0          |
| TOMATE    | Gusano ejercito      | Spodoptera endemia    | 0.2       | 0.4     | 2              | 0.5          |
| MAIZ      | Gusano cogollero     | Spodoptera frugiperda | 0.25-0.3  | 0.5-0.6 | 14             | 0.02         |

LMR: Límite Máximo de Residuos

P.C.: Período de Carenia

