20.5 cm

13 cm

17 cm

LANNACROP
90 SP

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

INSECTICIDA AGRICOLA

POLVO SOLUBLE - SP

COMPOSICIÓN:

Methomyl	900 g/kg
Aditivos	c.s.p. 1kg

Reg. PQUA Nº 775 - SENASA

"VENTA SÓLO POR PRESCRIPCIÓN DE UN INGENIERO AGRÓNOMO"

Titular del Registro: CROP BUSINESS S.A.C.

Importado y Distribuido por:

CROP BUSINESS S.A.C.
Alegría de Sembrar

Av. Mariano N° 09 Dpto 301
Urb. Santa Patricia I Etapa - La Molina - Lima
Teléfono 348-2881

Fecha de Formulación:
N° de Lote:
Contenido Neto: 1 Kg
Fecha de Vencimiento:

Formulado por:
HONBOR INDUSTRIAL CO., LTD.
30/F, Golden Center Tower N° 3037
Jintian Road CBD Futian, Shenzhen
CHINA

NO CORROSIVO **NO INFLAMABLE** **NO EXPLOSIVO**

ALTAMENTE PELIGROSO
TÓXICO

20.5 cm

"LEA LA ETIQUETA Y HOJA INFORMATIVA ADJUNTA ANTES DE USAR EL PRODUCTO"
"MANTÉNGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE NIÑO"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN:

- Evitar contacto con los ojos, la piel y la ropa.
- Evitar respirar polvos o rociadas, es peligroso.
- Causa irritación moderada a la piel.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Usar el producto en su envase original, etiquetado y cerrado.
- No almacenar o transportar conjuntamente con alimentos, bebidas, medicinas o forrajes.
- Utilizar ropa protectora durante el envasado, aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.
- Después de usar el producto, bañarse con abundante agua y jabón, cambiar de ropa y lavar la ropa contaminada.
- Prohibido el ingreso de personas al área de aplicación siguiendo la dirección del viento.
- Después de la aplicación, bañarse, cambiar, lavarse y cepillarse de ropa y lavarla antes de volverla a usar.

PRIMEROS AUXILIOS

- En caso de intoxicación:
- Si el producto ingresó, no administrar nada por vía oral si la persona está inconsciente o con convulsiones.
- En caso de contacto con los ojos: levantar los párpados y lavar los ojos con abundante agua y jabón.
- En caso de contacto con la piel: retirar la ropa contaminada y lavar la piel con abundante agua y jabón por 20 minutos.
- Si se inhala: llevar inmediatamente a la persona al aire libre, tratar de reanimarla (artificial si fuera necesario), tapar al paciente.
- Tratamiento médico: Administrar Sulfato de Atropina por vía intravenosa en NO Hipersensibles.
- Dosis de 2 mg de sulfato de atropina.
- Administrar 2.1 mg de sulfato de atropina vía intravenosa o intramuscular para adultos. Repetir la dosis en 10 intervalos de 30 minutos hasta que los síntomas se atenúen.
- En niños menores de 10 años administrar 0.05 mg/kg. Un sulfato de atropina y repetir cada 15-30 minutos hasta que su signo la compañía atropinización.

TELEFONOS DE EMERGENCIA:

CICOTOX : 0801-1-3040 CROP BUSINESS SAC : 349-2669
ESSALUD:0800-10399

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

- Después de usar el contenido, destruya este envase y deposítalo en los sitios destinados por las autoridades locales para esta fin.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE:

- Altamente peligroso para abejas.
- Peligroso para organismos acuáticos.
- No contaminar lagos, ríos, canales o acequias con los desechos y envases vacíos.
- Peligroso para los animales domésticos, aves, fauna y flora silvestre.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o agua contaminada.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 5 metros.
- En caso de derrame, proteger el producto y depositarlo en el sitio indicado por las autoridades locales para esta fin.
- El producto no debe aplicarse en zonas con napas freáticas superficiales o de suelos altamente permeables.

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO:

- **LANNACROP 90 SP** es un insecticida sistémico de amplio espectro que actúa por contacto e ingestión.
- **LANNACROP 90 SP** controla eficientemente insectos plagas chupadores y larvas comedoras de follaje.
- **LANNACROP 90 SP** puede ser aplicado con equipos convencionales terrestres con machetes o palanca, a mano, bombas, pistolas, etc.

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN

- Iniciar la aplicación de **LANNACROP 90 SP** cuando se observen los primeros indicios del ataque de la plaga.
- Toda aplicación debe ser posterior a una evaluación rigurosa del cultivo, el plan de daño dependerá de la interacción plaga-cultivo.
- En los cultivos de espárrago, tomate y pimiento se recomienda hasta un máximo de 2 aplicaciones por campaña. En el cultivo de maíz se recomienda hasta un máximo de 1 aplicación por campaña.
- Rotar con plaguicidas de diferente grupo químico entre aplicaciones.

PERIODO DE REINGRESO

Puede reingresar sin equipo de protección 48 horas después de aplicado el producto.

COMPATIBILIDAD

LANNACROP 90 SP es compatible con la mayoría de plaguicidas de uso común excepto con aquellas de reacción fuertemente alcalina o oxidante.

FITOTOXICIDAD

El producto no es fitotóxico cuando es utilizado según las indicaciones de la etiqueta.

RESPONSABILIDAD CIVIL

El Titular del Registro garantiza que las características fisicoquímicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, siempre y cuando se ajuste a las condiciones e instrucciones dadas.

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

CULTIVO	PLAGA		DOSIS		P.C. (días)	LMR (ppm)
	Nombre Común	Nombre Científico	kg/238 L	kg/ha		
ESPÁRRAGO	"Barrenador de brotes"	*Tibaldina chilensis*	0.2	0.4	1	2.0
	"Chusaca orgullosa"	*Spodoptera frugiperda*	0.25	0.5		
TOMATE	"Quisano agresivo"	*Spodoptera eridania*	0.2	0.4	2	0.5
MAÍZ	"Gusano cogollero"	*Spodoptera frugiperda*	0.1a-0.2	0.2-0.4	14	0.02
PALTO	"Bichu del palto"	*Oncylycus kiddy*	0.2	-	1	2.0
PIMIENTO	"Gusano del fruto"	*Symmetrischema capsicum*	0.2	0.4	3	0.02

P.C.: Periodo de Carencia (días) LMR: Límite Máximo de Residuos (ppm Parte por millón)

13 cm