

20.5 cm

13 cm

20.5 cm

13 cm

17 cm

METOKILL 90 SP

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

INSECTICIDA AGRÍCOLA

POLVO SOLUBLE - (SP)

COMPOSICIÓN:

Methomyl 900 g/kg
Aditivos c.s.p. 1 kg

Reg. PQUA Nº 711 - SENASA

"VENTA SÓLO POR PRESCRIPCIÓN DE UN INGENIERO AGRÓNOMO"

Titular del Registro: CROP BUSINESS S.A.C

Importado y Distribuido por:

CROP BUSINESS S.A.C.



Av. Melgarejo N° 580 Dpto. 301 Urb. Santa Patricia I Etapa - La Molina
Teléfono: 349-2699

Fecha de Formulación:
N° de Lote:
Contenido Neto: 1 Kg
Fecha de Vencimiento:

Formulado por:
NANJING RHONQUIM CO., LTD
N° 26 Majia Street, Nanjing Jiangsu, 210009
CHINA

NO CORROSIVO

NO INFLAMABLE

NO EXPLOSIVO

**ALTAMENTE PELIGROSO
TÓXICO**

"LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA Y LA HOJA INFORMATIVA ADJUNTA ANTES DE USAR EL PRODUCTO"
"MANTÉNGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN:

- Evitar el contacto con los ojos, la nariz y la ropa.
- Evitar respirar polvo y vapor durante el manejo del producto.
- Causa irritación respiratoria a los ojos.
- No comer, beber o fumar durante la mezcla y aplicación.
- No contaminar con el producto los alimentos, bebidas, medicinas ni forrajes.
- Guardar este producto en un lugar fresco, seco y cerrado.
- No permitir que los niños jueguen con el producto.
- No aplicar el producto en zonas de cultivo de hortalizas, frutas y verduras.
- Evitar la aplicación de este producto en días con abundante agua y viento, cambie y lave la ropa contaminada.
- Evitar la aplicación de este producto cuando la dirección del viento.
- Evitar de la mezcla y aplicación, lavarse y cambiarse de ropa y lavada antes de volver a usarlo.

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO:

- METOKILL 90 SP es un insecticida sistémico de amplio espectro que actúa por contacto e ingestión.
- METOKILL 90 SP controla eficientemente las plagas indicadas en el cuadro de usos.
- METOKILL 90 SP puede ser aplicado con equipos convencionales terrestres con mochilas a palanca, a motor, mochilas, perlas, etc.

INDICACIONES DE PRIMEROS AUXILIOS:

- **Ojos:** Si se irrita, lavar con abundante agua y jabón, cambiar y lavar la ropa contaminada.
- En caso de ingestión, no administrar nada por vía oral si la persona está inconsciente, no inducir al vómito.
- En caso de contacto con los ojos, lavarlos los parpados y lavar los ojos con abundante agua y jabón.
- En caso de contacto con la piel, retirar la ropa contaminada y lavar la piel con abundante agua y jabón por 20 minutos.
- En caso de inhalación: Mantener a la persona al aire libre, brindar respiración artificial si fuera necesario, llamar al médico.
- Tratamiento médico: Administrar Sulfato de Atropina por vía intravenosa o vía intramuscular.

NOTAL MÉDICO

- Antídoto: Sulfato de atropina.
- Administrar 2-3 mg de sulfato de atropina vía intravenosa o intramuscular para adultos. Repetir la dosis en 10 minutos de 30 minutos hasta que los síntomas se alivien.
- En niños (menores de 13 años) administrar 0.05 mg/kg de sulfato de atropina y repetir cada 15-30 minutos hasta que se logre la completa atropinización.

TELEFONOS DE EMERGENCIA:

SAMU 105
CROP BUSINESS SAC: 349 - 2699 ANEXO: 1005

CONDICIONES DE MANEJO Y DE DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS:

- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe reutilizarse. Después de usar el contenido inutilice la funda o bolsa protectora. Entregue o deposite en el lugar de destino dispuesto por las autoridades competentes para su gestión.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.
- Depositar el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE:

- Abastecer periódicamente para abejas.
- Peligroso para organismos acuáticos.
- No contaminar lagos, ríos, esteros, arroyos o acuíferos con los desechos y envases vacíos.
- Peligroso para los animales domésticos, aves, fauna y flora silvestre.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobranes del producto.
- Recoger una bandeja de no aplicación hacia campo de agua de al menos 3 metros.
- En caso de derrame, recoger el producto y depositarlo en el sitio destinado por las autoridades locales para este fin.
- El producto no debe aplicarse en zonas con napas freáticas superficiales o de sueltos altamente permeables.

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

CULTIVO	PLAGA		DOSIS		P.C (días)	P.C (ppm)
	Nombre Común	Nombre Científico	Kg/200 L	Kg/ha		
Espárrago	"Berenador de brotes"	<i>Heliothis virescens</i>	0.2	0.4	1	2.0
	"Gusano cogollero"	<i>Spodoptera frugiperda</i>	0.25	0.5	1	2.0
Tomate	"Gusano ejército"	<i>Spodoptera eridania</i>	0.2	0.4	2	0.5
Maíz	"Gusano cogollero"	<i>Spodoptera frugiperda</i>	0.25-0.3	0.5-0.6	14	0.02
Pimiento	"Pallita (gusano del fruto)"	<i>Symmetrischema capitatum</i>	0.2	0.4	3	0.7
Pallo	"Bicho del ceño"	<i>Oiketicus kátyi</i>	0.2	-	1	2.0

P.C.: Período de Carencia (Días)

LMR: Límite Máximo de Residuos (ppm: Partes por millón)



20.5 cm

13 cm

20.5 cm

13 cm

17 cm

METOKILL 90 SP

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

INSECTICIDA AGRÍCOLA

POLVO SOLUBLE - (SP)

COMPOSICIÓN:

Methomyl 900 g/kg
Aditivos c.s.p. 1 kg

Reg. PQUA Nº 711 - SENASA

“VENTA SÓLO POR PRESCRIPCIÓN DE UN INGENIERO AGRÓNOMO”

Titular del Registro: CROP BUSINESS S.A.C

Importado y Distribuido por:

CROP BUSINESS S.A.C.



Av. Melgarejo N° 580 Dpto. 301 Urb. Santa Patricia I Etapa - La Molina
Teléfono: 349-2699

Fecha de Formulación:
N° de Lote:
Contenido Neto: 1 Kg
Fecha de Vencimiento:

Formulado por:
SHANGHAI E-TONG CHEMICAL CO. LTD.
N° 23, Lane 5398, Shenzhuan Road
Songjiang District - Shanghai
CHINA

NO CORROSIVO

NO INFLAMABLE

NO EXPLOSIVO

**ALTAMENTE PELIGROSO
TÓXICO**

SENASA

ETIQUETA PARA USO EXCLUSIVO

“LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA Y LA HOJA INFORMATIVA ADJUNTA ANTES DE USAR EL PRODUCTO”
“MANTÉNGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS”

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN:

- Evitar el contacto con los ojos, la piel y la ropa.
- Evitar respirar polvo y vapor durante la mezcla y aplicación.
- Causa irritación respiratoria a los ojos.
- No comer, beber o fumar durante la mezcla y aplicación.
- Guardar este producto en un lugar fresco, seco, bien tapado y cerrado.
- No permitir que los niños jueguen con el producto, alimentos, bebidas, medicinas ni forraje.
- No permitir que los animales entren en contacto con el producto, aplicación y para regar el área tratada en las primeras 24 horas de aplicación.
- Evitar el contacto con la piel con abundante agua y jabón, cámbiese y lave la ropa contaminada.
- Evite la operación de aplicación siguiendo la dirección del viento.
- Evite de la mezcla y aplicación, lavarse y cambiarse de ropa y lavada antes de volver a usarlo.

INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS:

- **Ojos:** - Si se irrita, lavar con abundante agua y jabón.
- En caso de ingestión, no administrar nada por vía oral si la persona está inconsciente, no inducir al vómito.
- En caso de contacto con los ojos, lavarlos los parpados y lavar los ojos con abundante agua y jabón.
- En caso de contacto con la piel, retirar la ropa contaminada y lavar la piel con abundante agua y jabón por 20 minutos.
- En caso de inhalación: Mantener a la persona al aire libre, brindar respiración artificial si fuera necesario, llamar al médico.
- Tratamiento médico: Administrar Sulfato de Atropina por vía intravenosa o vía intramuscular.

NOTAL MÉDICO

- Antídoto: Sulfato de atropina.
- Administrar 2-3 mg de sulfato de atropina vía intravenosa o intramuscular para adultos. Repetir la dosis en 10 minutos de 30 minutos hasta que los síntomas se alivien.
- En niños (menores de 13 años) administrar 0.05 mg/kg de sulfato de atropina y repetir cada 15-30 minutos hasta que se logre la completa atropinización.

TELÉFONOS DE EMERGENCIA:
SAMU 105
CROP BUSINESS SAC: 349 - 2699 ANEXO: 1005

CONDICIONES DE MANEJO Y DE DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS:

- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe reutilizarse. Después de usar el contenido inutilice la funda o bolsa protectora. Entregue o deposite en el lugar de destino dispuesto por las autoridades competentes para su gestión.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE:

- Abastecer plásticos para abrigos.
- Peligroso para organismos acuáticos.
- No contaminar lagos, ríos, esteros, arroyos o acuíferos con los desechos y envases vacíos.
- Peligroso para los animales domésticos, aves, fauna y flora silvestre.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobranes del producto.
- Recoger una bandeja de no aplicación hacia campo de agua de al menos 3 metros.
- En caso de derrame: recoger el producto y depositarlo en el sitio destinado por las autoridades locales para este fin.
- El producto no debe aplicarse en zonas con napas freáticas superficiales o de sueltos altamente permeables.

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO:

- METOKILL 90 SP es un insecticida sistémico de amplio espectro que actúa por contacto e ingestión.
- METOKILL 90 SP controla eficientemente las plagas indicadas en el cuadro de usos.
- METOKILL 90 SP puede ser aplicado con equipos convencionales terrestres con mochilas a palanca, a motor, tractoras, parafleas, etc.

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN:

- Iniciar la aplicación de METOKILL 90 SP cuando se observen los primeros indicios del ataque de la plaga.
- Toda aplicación debe ser posterior a una evaluación rigurosa del cultivo, el nivel de daño dependiente de la infestación plaga-cultivo.
- En los cultivos de espinaca, tomate y pimiento se recomienda hasta un máximo de 2 aplicaciones por campaña/ciclo. En el cultivo de maíz se recomienda hasta un máximo de 1 aplicación por campaña/ciclo.
- En el cultivo de palto se recomienda hasta un máximo de 2 aplicaciones por campaña/ciclo.
- Rotar con plaguicidas de diferente grupo químico entre aplicaciones.

PERIODO DE REINGRESO:

Puede reingresar un equipo de protección 48 horas después de aplicado el producto.

COMPATIBILIDAD:

METOKILL 90 SP es compatible con la mayoría de plaguicidas de uso común excepto con aquellos de reacción fuertemente alcalina u oxidante.

FITOTOXICIDAD:

El producto no es fitotóxico cuando es utilizado según las indicaciones de la etiqueta.

RESPONSABILIDAD CIVIL:

El Titular del Registro garantiza que las características fitoquímicas del producto contenido en este envase corresponden a las indicadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular del registro o con el distribuidor del producto.

“CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO”

CULTIVO	PLAGA		DOSIS		P.C (días)	P.C (ppm)
	Nombre Común	Nombre Científico	Kg/200 L	Kg/ha		
Espinaca	"Berenador de brotes"	<i>Heliothis virescens</i>	0.2	0.4	1	2.0
	"Gusano cogollero"	<i>Spodoptera frugiperda</i>	0.25	0.5	1	2.0
Tomate	"Gusano ejército"	<i>Spodoptera eridania</i>	0.2	0.4	2	0.5
Maíz	"Gusano cogollero"	<i>Spodoptera frugiperda</i>	0.25-0.3	0.5-0.6	14	0.02
Pimiento	"Pallita (gusano del fruto)"	<i>Symmetrischema capsicari</i>	0.2	0.4	3	0.7
Palto	"Bicho del ceasto"	<i>Oiketicus kathyi</i>	0.2	-	1	2.0

P.C.: Período de Carenza (Días)

LMR: Límite Máximo de Residuo (ppm: Partes por millón)

