

8.5 cm

NO EXPLOSIVO

"LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO"
"MANTÉNGASE BAJO LLAVE. FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN:

- Este producto es de cuidado, no ingerir.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Conservar este producto en su envase original, etiquetado y cerrado.
- Almacenar el producto en un lugar seco, a temperatura fresca y ventilado.
- No usar el envase para conservar alimentos ni agua para consumo.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos bebidas, medicinas ni forrajes.
- Quitar las manos de usar el producto, báñese con abundante agua y jabón, cámbiese y lave la ropa contaminada.
- Utilizar ropa protectora durante el manipuleo, aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.
- El producto puede ser ingerido por ingestión e inhalación.
- Realice la operación de aplicación siguiendo la dirección del viento.

PRIMEROS AUXILIOS

- Grupo Químico: Triazolol + Estrobilurina
- En caso de intoxicación, lleve al paciente inmediatamente al médico y muéstrele la etiqueta.
- En caso de ingestión, no provoque el vómito, ni dar beber agua a la persona si está inconsciente.
- En caso de contacto con los ojos, manténgalos abiertos y lávelos inmediatamente con agua limpia durante 15 minutos.
- En caso de contacto con la piel, retirar la ropa y zapatos y lavar la piel con abundante agua y jabón.
- En caso de inhalación retirar al paciente a un lugar fresco y aplicar respiración artificial si fuera necesario.
- No tiene antídoto, dar tratamiento sintomático.

TELÉFONOS DE EMERGENCIA:

CICOTOX : 0800-1-3040 CROP BUSINESS SAC : 349-2669
CISPROQUIM: 0800-5-0847

CONDICIONES DE MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

- ENVASES VACÍOS**
- Después de usar el contenido destruya este envase y deposítelo en los sitios destinados por la autoridades locales para este fin.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL MEDIO

AMBIENTE

- Peligroso para peces y demás organismos acuáticos.
- No contaminar lagos, ríos, estanques, arroyos u otras fuentes de agua con los desechos, restos de la aplicación, sobrantes del producto o envases vacíos.
- Restar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua, de al menos 10 metros.
- El producto no debe aplicarse en zonas con napas freáticas superficiales y/o subterráneas.
- Peligroso para animales domésticos, fauna y flora silvestre.
- El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.
- En caso de derrames, recoger el producto inmediatamente y depositarlo en un lugar seguro a fin de evitar su lixiviación.

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO:

- **ROYALTY 75 WG**, es un fungicida sistémico, cuyos ingredientes activos actúan de manera complementaria, el tebuconazole inhibe la síntesis del ergosterol, mientras que el trifloxystrobin afecta la respiración celular, logrando la muerte del hongo.
- **ROYALTY 75 WG**, se aplica en aspersión, previa mezcla con agua. Realizar una premezcla en un volumen menor de agua, agitar bien y luego agregar el resto de agua hasta completar el volumen requerido. Usar preferentemente agua con un pH entre 6.8 a 7.5. Aplicar con cualquier equipo convencional terrestre en buen estado y debidamente calibrado.

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN

- En Cebolla: cuando se encuentre en campo el 5% de hojas afectadas, especialmente en la etapa de engrosamiento del bulbo.
En Vid: cuando se observen los primeros síntomas en brotes verdes y cuando encuentre un 20% de inflorescencias afectadas.
En Arroz: cuando se observen los primeros síntomas de la enfermedad, no mayor al 5% de severidad, durante la época de macollamiento y formación de la panícula.

- Número máximo de aplicaciones
En Cebolla: máximo aplicar 01 aplicación por campaña, considerando 2 campañas/año.
En Vid: máximo aplicar 02 aplicaciones por campaña, considerando 1 campaña/año, con un volumen de gasto de agua máximo de 1000 litros por hectárea.
En Arroz: máximo aplicar, 2 aplicaciones por campaña, con un intervalo de 10 a 14 días, considerando 2 campañas al año.
- No aplicar ROYALTY 75 WG, consecutivamente, sino alternar con otro fungicida de diferente modo de acción.

PERIODO DE REINGRESO

- Puede reingresar al área tratada, 24 horas después de la aplicación.

COMPATIBILIDAD

- ROYALTY 75 WG** es compatible con la mayoría de plaguicidas de uso común excepto con aquellas de reacción fuertemente ácidas, alcalinas u oxidante.

FITOTOXICIDAD

- El producto ROYALTY 75 WG no es fitotóxico cuando es utilizado según lo indicado en la etiqueta.**

RESPONSABILIDAD CIVIL

- El Titular del Registro garantiza que las características fisicoquímicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

CULTIVO	PLAGA		DOSIS			P.C. (dias)	LPM ¹
	Nombre Común	Nombre Científico	kg/200 L	kg/ha	%		
Cebolla	Punta seca	<i>Steromyium vesicarium</i>	-	0.3 - 0.5	-	14	0.02
Vid	Oidium	<i>Erysiphe necator</i>	-	0.3	0.03	21	2.0 ²
	Moho gris	<i>Botrytis cinerea</i>	-	0.3 - 0.35	0.03 - 0.035	15	5.0 ²
Arroz	Pycularia	<i>Pycularia oryzae</i>	-	0.2 - 0.25	-	35	0.02
	Roya del caféto		0.2	-	-	30	0.1 ¹
Café	Ojo de gallo	<i>Mycena citricolor</i>	0.15 - 0.2	-	-	30	0.05 ¹
Pimiento	Oidium	<i>Leveillula taurica</i>	0.125	0.25	-	7	0.3 ¹

LMR: Límite Máximo de Residuo

P.G.: Período de Gargancia

*Tebuconazole

^aTrifloxystrobin

**LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO**

