

18.0 cm

15 cm

4.5 cm

15 cm

4.5 cm

# ROYALTY

## 75 WG

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

**FUNGICIDA AGRÍCOLA**

**GRÁNULO DISPERSABLE - WG**

COMPOSICIÓN:

Tebuconazole	500 g/kg
Trifloxystrobin	250 g/kg
Aditivos	c.s.p. 1 Kg

Reg. PQUA N° 720 - SENASA  
Titular del Registro: CROP BUSINESS S.A.C.

Importado y Distribuido por:

**CROP BUSINESS S.A.C.**



Av. Melgarejo N° 580 Dpto. 301  
Urb. Santa Patricia I Etapa - La Molina - Lima  
Teléfono: 349-2669

Fecha de Formulación:  
N° de Lote:  
Contenido Neto: 250 grs.  
Fecha de Vencimiento:

Formulado por:  
SHANGHAI E-TONG CO., LTD  
N° 23, Laine 5398, Shenzhuan Road  
Songjiang District, Shanghai  
CHINA

**NO CORROSIVO      NO INFLAMABLE      NO EXPLOSIVO**

**LIGERAMENTE PELIGROSO  
CUIDADO**

**"LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO"  
"MANTÉNGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"**

- PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN:**
- Este producto es de cuidado, no ingerir.
  - No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
  - Conservar este producto en su envase original, etiquetado y cerrado.
  - Almacenar el producto bajo techo en un lugar fresco y ventilado.
  - No usar el envase para conservar alimentos ni agua para consumo.
  - No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, bebidas, medicinas ni forrajes.
  - Después de usar el producto, báñese con abundante agua y jabón, cámbiese y lave la ropa contaminada.
  - Utilizar ropa protectora durante el manejo, aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.
  - El producto puede ser nocivo por ingestión e inhalación.
  - Realice la operación de aplicación siguiendo la dirección del viento.

- PRIMEROS AUXILIOS**
- Grupo químico: Triazol + Estrobilina
  - En caso de intoxicación, lleve al paciente inmediatamente al médico y muéstrela la etiqueta.
  - En caso de ingestión, no provoque el vómito, ni dar beber agua a la persona si está inconsciente.
  - En caso de contacto con los ojos, manténgalos abiertos y lávelos inmediatamente con agua limpia durante 15 minutos.
  - En caso de contacto con la piel, retire la ropa y zapatos y lavar la piel con abundante agua y jabón.
  - En caso de inhalación retire al paciente a un lugar fresco y aplicar respiración artificial si fuera necesario.
  - No tiene antídoto, dar tratamiento sintomático.

**TELÉFONOS DE EMERGENCIA:**  
CICOTOX : 0800-1-3040 CROP BUSINESS SAC : 349-2669  
CISPROQUIM: 0800-5-0847

**CONDICIONES DE MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS**

- Después de usar el contenido destruya este envase y deposítelo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin.

- MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE:**
- Peligroso para peces y demás organismos acuáticos.
  - No contaminar lagos, ríos, estanques, arroyos u otras fuentes de agua con los desechos, restos de la aplicación, sobantes del producto o envases vacíos.
  - Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua, de al menos 10 metros.
  - El producto no debe aplicarse en zonas con napas freáticas superficiales y/o subterráneas.
  - Peligroso para animales domésticos, fauna y flora silvestre.
  - El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.
  - En caso de derrames, recoger el producto inmediatamente y depositarlo en un lugar seguro a fin de evitar su lixiviación.

**INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO:**

- **ROYALTY 75 WG**, es un fungicida sistémico, cuyos ingredientes activos actúan de manera complementaria, el tebuconazole inhibe la síntesis del ergosterol, mientras que el trifloxystrobin afecta la respiración celular, logrando la muerte del hongo.
- **ROYALTY 75 WG**, se aplica en aspersión, previa mezcla con agua. Realizar una premezcla en un volumen menor de agua, agitar bien y luego agregar el resto de agua hasta completar el volumen requerido. Usar preferentemente agua con un pH entre 6.8 a 7.5. Aplicar con cualquier equipo convencional terrestre en buen estado y debidamente calibrado.

**FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN**

- Aplicar previa evaluación de la plaga.
- En Cebolla: cuando se encuentre en campo el 5% de hojas afectadas, especialmente en la etapa de engrosamiento del bulbo.
- En Vid: cuando se observen los primeros síntomas en brotes verdes y cuando encuentre un 20% de inflorescencias afectadas.
- En Arroz: cuando se observen los primeros síntomas de la enfermedad, no mayor al 5% de severidad, durante la época de macollamiento y formación de la panícula.

- Número máximo de aplicaciones
- En Cebolla: máximo aplicar 01 aplicación por campaña, considerando 2 campañas/año.
- En Vid: máximo aplicar 02 aplicaciones por campaña, considerando 1 campaña/año, con un volumen de gasto de agua máximo de 1000 litros por hectárea.
- En Arroz: máximo aplicar, 2 aplicaciones por campaña, con un intervalo de 10 a 14 días, considerando 2 campañas al año.
- En Espárrago: Realice máximo una (01) aplicación por campaña, dos (02) campañas al año.
- No aplicar ROYALTY 75 WG, consecutivamente, sino alternar con otro fungicida de diferente modo de acción.

**PERIODO DE REINGRESO**

Puede reingresar al área tratada, 24 horas después de la aplicación.

**COMPATIBILIDAD**

ROYALTY 75 WG es compatible con la mayoría de plaguicidas de uso común excepto con aquellas de reacción fuertemente ácidas, alcalinas u oxidante.

**FITOTOXICIDAD**

El producto ROYALTY 75 WG no es fitotóxico cuando es utilizado según lo indicado en la etiqueta.

**RESPONSABILIDAD CIVIL**

El Titular del Registro garantiza que las características fisicoquímicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.

**"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"**

CULTIVO	PLAGA		DOSIS			P.C. (días)	LMR (ppm)
	Nombre Común	Nombre Científico	kg/200 L	kg/ha	%		
Cebolla	Punta seca	<i>Stemphylium vesicarium</i>	-	0.3 - 0.5	-	14	0.02
Vid	Oidium	<i>Erysiphe necator</i>	-	0.3	0.03	21	2.0*
	Moho gris	<i>Botrytis cinerea</i>	-	0.3 - 0.35	0.03 - 0.035		5.0**
Arroz	Pyricularia	<i>Pyricularia oryzae</i>	-	0.2 - 0.25	-	35	0.02
Café	Roya del café	<i>Hemileia vastatrix</i>	0.2	-	-	30	0.1*
	Ojo de gallo	<i>Mycena citricolor</i>	0.15 - 0.2	-	-	-	0.05**
Pimiento	Oidium	<i>Leveillula taurica</i>	0.125	0.25	-	7	0.3**
Espárrago	Mancha del peral	<i>Stemphylium vesicarium</i>	-	0.3	-	100	0.02* 0.05**

LMR: Límite Máximo de Residuos      P.C.: Período de Carencia      \*Tebuconazole      \*\*Trifloxystrobin

