

20.00 cm

Fenkil® 3% PS

INSECTICIDA AGRÍCOLA

POLVO SECO - DP

COMPOSICIÓN:

Phenthoate..... 30 g/kg
Aditivos970 g/kg

Titular del Registro: **NEO AG SAC**
Calle Meliton Porras 392, Miraflores - Lima
Teléfono: 617-6400 / Fax: 617-6401
Importado y distribuido por: **NEO AG SAC**

Formulado por: **SERFI S.A**
Km. 9.5 Carretera Central. Ate-Vitarte - PERÚ

Reg. PQUA N°: 194 - SENASA

N° de Lote :

F. de Form. :

F. de Venc. :

LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO "MANTÉNGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN:

- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- Después de usar el producto, cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación y para ingresar al área tratada durante las primeras 24 horas.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.
- No reenvasar o depositar el contenido en otros envases.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

PRIMEROS AUXILIOS:

- **Grupo Químico: Organofosforado.**
- En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente, o lleve al paciente al médico y muéstrela la etiqueta y la hoja informativa adjunta.
- En caso de contacto con los ojos, lavarlos con abundante agua fresca y, si el contacto fuera con la piel, lavarse con abundante agua y jabón.

En caso de emergencia toxicológica llamar a:
CICOTOX: 0800 - 1 - 3040 **NEO AGRUM S.A.C.: 617-6400**

- Beber abundante agua salada para inducir el vómito.
- Administrar sulfato de atropina.

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS:

- Después de usar el contenido, destruya este envase y deposítelo en los sitios destinados por las autoridades para este fin.
- Los sobrantes deberán ser llevados a un vertedero aprobado y enterrados, teniendo cuidado de no contaminar acequias o depósitos de agua potable.
- No reutilizar los envases.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE :

- Peligroso para abejas y artrópodos benéficos, no aplicar en épocas de floración.
- Peligroso para organismos acuáticos
- No contaminar fuentes de agua con los restos de la aplicación o desechos sobrantes del producto.
- El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.
- En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en el sitio destinado por las autoridades para tal fin.

NO CORROSIVO

NO INFLAMABLE

NO EXPLOSIVO

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO:

FENKIL 3% PS es un insecticida del grupo de los fosforados que actúa por contacto, profundidad e ingestión controlando insectos que atacan los cultivos recomendados.

Por su selectividad, poder residual y baja toxicidad para los animales de sangre caliente, esta recomendado para el control de plagas de granos en almacenamiento.

Se emplea en espolvoreo, esparciendo el producto directamente al suelo, follaje o para tratamientos de paredes, techos y pisos de molinos, silos y depósitos de granos. Las aplicaciones se hacen mediante espolvoreadoras mecánicas o manuales.

CONSULTE AL INGENIERO AGRÓNOMO

CUADRO DE RECOMENDACIONES:

CULTIVO	PLAGAS		DOSIS	P.C. (días)	L.M.R. (ppm)
	Nombre Común	Nombre Técnico			
Algodón	Gorgojo de la chupadera	<i>Eurynothrus gossypii</i>	25 - 30 kg/ha	-	n.d.
	Arrebatado	<i>Dysdercus peruvianus</i>	25 - 30 kg/ha	-	n.d.
Espárrago	Barrenador de brotes	<i>Prodidiplosis longifila</i>	25 kg/ha	n.d.	0.05
Granos almacenados					
Arroz	Gorgojo de arroz	<i>Sitophilus oryzae</i>	330 - 660 g/ha de grano	-	0.05
	Frijol	<i>Zabrotes subtruncatus</i>	330 - 660 g/ha de grano	-	0.05
Maíz	Gusano de tierra	<i>Feltia experta</i>	10 - 15 kg/ha	7	0.05
Papa	Gusano de tierra	<i>Feltia experta</i>	10 - 15 kg/ha	7	0.05
	Gorgojo de los andes	<i>Premnotrypes vorax</i>	25 - 50 kg/ha	7	0.05

P.C.: Período de carencia L.M.R.: Límites máximos de residuos N.D.: No determinado

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN: Aplicar en pleno crecimiento vegetativo de los cultivos. Se debe aplicar una vez por campaña.

PERÍODO DE REINGRESO: Se recomienda reingresar 24 horas después de la aplicación.

COMPATIBILIDAD: Para la conservación de los granos que serán utilizados como semillas, es compatible con la mayoría de desinfectantes de semillas utilizados para prevenir el ataque de enfermedades fúngicas exceptuándose los de reacción alcalina.

FITOTOXICIDAD: No es fitotóxico para los cultivos recomendados y no hay efectos en los cultivos sucesivos.

RESPONSABILIDAD CIVIL: El Titular del Registro garantiza que las características físico-químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.

Contenido neto: 22 kg

**LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO**



31.00 cm

4.5 cm