

4.5 cm

EXATIL

75 WG

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

FUNGICIDA AGRÍCOLA

GRÁNULO DISPERSABLE - WG

Composición:

Tebuconazole	500 g/Kg
Trifloxystrobin	250 g/Kg
Aditivos	c.s.p 1Kg

Reg PQUA N° 781 - SENASA

Titular del Registro: CROP BUSINESS S.A.C

Importado y Distribuido por:

CROP BUSINESS S.A.C.



Av. Melgarejo N° 580 Dpto. 301 Urb. Santa Patricia I Etapa - La Molina

Teléfono: 349-2669

Fecha de Formulación:

N° de Lote:

Contenido Neto: 20 gr.

Fecha de Vencimiento:

Formulado por:

NANJING RHONQUIM CO., LTD

N° 26 Majia Street, Nanjing Jiangsu, 210009

CHINA

NO CORROSIVO
NO INFLAMABLE
NO EXPLOSIVO

GRÁNULO DISPERSABLE - WG

Reg PQUA N° 781 - SENASA
Titular del Registro: CROP BUSINESS S.A.C



Formulado por:
NANJING RHONQUIM CO., LTD
Nº 26 Majia Street, Nanjing Jiangsu, 210009
CHINA

NO EXPLOSIVO

**LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO**

- No aplicar **LUXATE 75 WG**, consecutivamente, sino alternar con otro fungicida de diferente modo de acción.

RESPONSABILIDAD CIVIL
El Titular del Registro garantiza que las características fisicoquímicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular del registro.

CULTIVO	PLAGA		DOSIS			P.C (dias)	P.C (ppm)
	Nombre Común	Nombre Científico	Kg/200 L	Kg/ha	%		
Cebolla	Punta seca	<i>Stemphylium vesicarium</i>	-	0.3 - 0.5	-	14	0.02
Vid	Odium	<i>Erysiphe necator</i>	-	0.3	0.03	21	2.0*
Moho gris	Moho gris	<i>Botrytis cinerea</i>	-	0.3 - 0.35	0.03 - 0.035	-	5.0**
Arroz	Piticulicaria	<i>Piticulicarya oryzae</i>	-	0.2 - 0.25	-	35	0.02
Café	Roya del café	<i>Hemileia vastatrix</i>	0.2	-	-	3	0.1*
	Ojo de gallo	<i>Mycescra taurica</i>	0.15 - 0.2	-	-	30	0.05**
Pimiento	Odium	<i>Leveillula theibicola</i>	0.125	0.25	-	7	0.5*

P.C.: Período de carencia (días) L.M.R.: Límite máximo de residuos (ppm: Partes por millón) *Tebuconazole **Trifloxystrobin




4.5 cm

LUXATE 75 WG

FUNGICIDA AGRÍCOLA

Composición:	
Tebuconazole	500 g/Kg
Trifloxystrobin	250 g/Kg
Aditivos	c.s.p 1Kg

Importado y Distribuido por:
CROP BUSINESS S.A.C



Fecha de Formulación: Formulado por:
 Nº de Lote: **NANJING RHONQUIM CO., LTD**
Contenido Neto: 250 gr. Nº 26 Majia Street, Nanjing Jiangsu, 210009
 Fecha de Vencimiento: CHINA

~~NO CORROSIVO~~ NO INFLAMABLE NO EXPLOSIVO

"LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO"
"MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- Este producto es de cuidado, no ingerir.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Conservar este producto en su envase original, etiquetado y cerrado.
- Almacenar el producto bajo techo en un lugar fresco y ventilado.
- No usar el envase para conservar alimentos ni agua para consumo.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos bebidas, medicinas ni forrajes.
- Después de usar el producto, báñese con abundante agua y jabón, cámbiese de ropa y lave la ropa contenida.
- Utilizar ropa protectora durante el manipuleo, aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.
- El producto puede ser nocivo por ingestión e inhalación.
- Realice la operación de aplicación siguiendo la dirección del viento.

PRIMEROS AUXILIOS:

- **Grupo químico: Triazol + Estrobirulina**
- En caso de intoxicación, lleve al paciente inmediatamente al médico y muestre la etiqueta.
- En caso de ingestión, no provoque el vómito, ni dar beber agua a la persona si está inconsciente.
- En caso de contacto con los ojos, manténgalos abiertos y lávelos inmediatamente con agua limpia durante 15 minutos.
- En caso de contacto con la piel, retire la ropa y zapatos y lavar la piel con abundante agua y jabón.
- En caso de inhalación retirar al paciente a un lugar fresco y aplicar respiración artificial si fuera necesario.

Nota al médico: No tiene antídoto. dar tratamiento sintomático

TELÉFONOS DE EMERGENCIA

CROP BUSINESS SAC: 349 - 2669 ANEXO: 1005

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe reutilizarse. Después de usar el contenido inutilice la funda o bolsa cortándola. Entréguela o deposítela en el lugar de destino dispuesto por la autoridad competente, para su gestión.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE

- Peligroso para peces y demás organismos acuáticos.
- No contaminar lagos, ríos, estanques, arroyos u otras fuentes de agua con los desechos, restos de la aplicación, sobrantes del producto o envases vacíos.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua, de al menos 10 metros.
- El producto no debe aplicarse en zonas con napas freáticas superficiales y/o subterráneas.
- Peligroso para animales domésticos, fauna y flora silvestre.
- El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.
- En caso de derrames, recoger el producto inmediatamente y depositarlo en un lugar seguro a fin de evitar su lixiviación.

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO:

- **LUXATE 75 WG** es un fungicida sistémico, cuyos ingredientes activos actúan de manera complementaria, el tebuconazole inhibe la síntesis del ergosterol, mientras que el trifloxystrobin afecta la respiración celular, logrando la muerte del hongo.
- **LUXATE 75 WG** se aplica en aspersión, previa mezcla con agua. Realizar una premezcla en un volumen menor de agua, agitar bien y luego agregar el resto de agua hasta completar el volumen requerido. Usar preferentemente agua con un pH entre 5.5 a 7.5. Aplicar con cualquier equipo convencional terrestre o aéreo, en estado y

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN:

- FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN:**
 En Cebolla: cuando se encuentre en campo el 5% de hojas afectadas, especialmente en la etapa de crecimiento del bulbo.
 En Vid: cuando se observen los primeros síntomas en brotes verdes y cuando encuentre un 20% de infestancias afectadas.
 En Arroz: cuando se observen los primeros síntomas de la enfermedad, no mayor al 5% de severidad, durante la época de crecimiento y formación del panico.
Número máximo de aplicaciones:
 En Cebolla: máximo 01 aplicación por campaña, considerando 2 campañas/año.
 En Vid: máximo 01 aplicación por campaña, considerando 1 campaña/año, con un volumen de gasto de agua máximo de 1000 litros por hectárea.
Intervalo de aplicación:
 En Cebolla: aplicar, 2 aplicaciones por campaña, con un intervalo de 14 días; considerando 2 campañas al año.
 En Vid: aplicar LUXATE 75 WG consecutivamente, sino alternar con otro producto de diferente modo de acción.

PERIODO DE REINGRESO

PERIODO DE REINGRESO
Puede reingresar al área tratada, 24 horas después de la aplicación.

COMPATIBILIDAD

LUXATE 75 WG es compatible con la mayoría de plaguicidas de uso común excepto con aquellas de reacción fuertemente ácidas, alcalinas u oxidante.

FITOTOXICIDAD

El producto **LUXATE 75 WG** no es fitotóxico cuando es utilizado según lo indicado en la etiqueta.

RESPONSABILIDAD CIVIL

El Titular del Registro garantiza que las características fisicoquímicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular de registro.

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

CULTIVO	PLAGA		DOSIS			P.C (dias)	P.C (ppm)
	Nombre Común	Nombre Científico	Kg/200 L	Kg/Ha	%		
Cebolla	Punta seca	<i>Stemphylium vesicarium</i>	0.3	0.5 - 0.5	-	14	0.02
Vid	Oidium	<i>Erysiphe necator</i>	-	0.3	0.03	21	2.0 ^a 5.0 ^a
Maíz	Moho gris	<i>Botrytis cinerea</i>	-	0.3 - 0.35	0.03 - 0.035	-	-
Alfalfa	Pyculicaria	<i>Pyculicaria oryzae</i>	-	0.2 - 0.25	-	35	0.02
Café	Roya del café	<i>Hemileia vastatrix</i>	0.2	-	-	30	0.1 ^a 0.05 ^a
Ojo de gallo	Ojo de gallo	<i>Myrcena auricularis</i>	0.15 - 0.2	-	-	30	0.5 ^a 0.3 ^a
Peperino	Oidium	<i>Leveillula taurica</i>	0.125	0.25	-	7	-

P.C.: Período de carencia (días) L.M.R.: Límite máximo de residuos (ppm: Partes por millón) *Tebuconazole **Trifloxystrobin

LIGERAMENTE PELIGROSO CUIDADO

