

0.7 cm

7.7 cm

21.0 cm

0.5 cm

LEA LA ETIQUETA Y HOJA INFORMATIVA ADJUNTA ANTES DE USAR EL PRODUCTO
"MANTÉNGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN:

- El producto es nocivo por ingestión.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- No transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas, ni forrajes.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación y para ingresar al área tratada durante las primeras 24 horas.
- No permitir personas embarazadas cerca al área tratada. Posible teratógeno, puede causar daño al feto.

PRIMEROS AUXILIOS:

- Grupo químico: Benzimidazol
- En caso de intoxicación, retirar a la persona de la zona contaminada, llame al médico inmediatamente o lleve al paciente al médico y muéstrele la etiqueta y hoja informativa adjunta.

TELÉFONOS DE EMERGENCIA:

CICOTOX: 08001 - 3040 BIOAGROCORP TRADING SAC: 348-0009

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS:

- Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo, triturándolo o perforándolo y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE:

- Peligroso para organismos acuáticos.
- No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos.
- Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- El producto no debe aplicarse en zonas con napas freáticas superficiales o en suelos altamente permeables.
- En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en el sitio destinado por las autoridades para tal fin.



FUNGIZIM

500 SC

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

FUNGICIDA AGRÍCOLA
SUSPENSIÓN CONCENTRADA - SC

COMPOSICIÓN:

Carbendazim 500 g/L
Aditivos c.s.p. 1 L

Reg. PQUA N° 795 - SENASA

Titular del Registro: BIOAGROCORP TRADING S.A.C.

Importado y distribuido por:

BIOAGROCORP TRADING S.A.C.



Av. Melgarejo N° 580 Dpto. 402 Urb. Santa Patricia I Etapa - La Molina
Teléfono: 348-0009

Fecha de Formulación:

N° de Lote:

Contenido Neto: 250 ml

Fecha de Vencimiento:

Formulado por:
HANGZHOU CHANGHE AGRICULTURAL CHEMICAL CO., LTD
84 Riverside Ward, Changhe Town, Hangzhou - Zhejiang
CHINA



INFLAMABLE

NO EXPLOSIVO

NO CORROSIVO

LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO:

FUNGIZIM 500 SC es un fungicida sistémico de amplio espectro con acción protectora y curativa.

FUNGIZIM 500 SC impide el desarrollo de las hifas, la formación de aporesorios y el crecimiento del micelio. Detiene el desarrollo del tubo germinativo provocando irregularidades en la división celular y dando lugar a células anormales que provocan la muerte del hongo.

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

CULTIVO	PLAGA		DOSIS		P.C. (días)	L.M.R. (ppm)
	Nombre Común	Nombre Técnico	L/200 L	L/Ha		
Mandarina	Moho gris	<i>Botrytis cinerea</i>	0.3	1.5	14	0.7
Tomate	Moho gris	<i>Botrytis cinerea</i>	0.3-0.5	0.6 - 1.0	7	0.5
Vid	Moho gris	<i>Botrytis cinerea</i>	0.2	-	21	0.3
Arroz	Chupadera fungosa	<i>Rhizoctonia solani</i>	-	0.5	56	0.01

P.C.: Período de carencia (días)

L.M.R.: Límites máximos de residuos (ppm: partes por millón)

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN: Aplicar FUNGIZIM 500 SC al observarse los primeros síntomas de la enfermedad. Se recomienda hasta un máximo de 2 aplicaciones por cultivo/campaña/año.

PERIODO DE REINGRESO: No reingresar al campo tratado antes de 24 horas de realizada la aplicación.

FITOTOXICIDAD: FUNGIZIM 500 SC no es fitotóxico para los cultivos recomendados.

RESPONSABILIDAD CIVIL: El Titular del Registro garantiza que las características físico-químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.



1.20 cm