

1 cm

22.6 cm

0.5 cm

12 cm

1.8 cm

“LEA LA ETIQUETA Y HOJA INFORMATIVA ADJUNTA ANTES DE USAR EL PRODUCTO”

“MANTENGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS”

**PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN:**

- El producto es nocivo por ingestión.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- No transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación y para ingresar al área tratada durante las primeras 24 horas.
- No permitir el ingreso de niños, personas en general ni animales domésticos al área tratada.
- No permitir personas embarazadas cerca al área tratada. Posible teratógeno, puede causar daño al feto.

**PRIMEROS AUXILIOS:**

- Grupo químico: Benzimidazol
- En caso de intoxicación, retirar a la persona de la zona contaminada, llame al médico inmediatamente o lleve al paciente al médico y muéstrele la etiqueta y la hoja informativa adjunta.

**TELÉFONOS DE EMERGENCIA**

CICOTOX: 08001-3040      BIOAGROCORP TRADING SAC: 348-0009

**MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS:**

- Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilicelo triturándolo o perforándolo y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.

**MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE**

- Peligroso para los organismos acuáticos.
- No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 05 metros.
- Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.

# FUNGIZIM

## 500 SC

**PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA**

**FUNGICIDA AGRÍCOLA**

**SUSPENSIÓN CONCENTRADA - SC**

**Composición:**

Carbendazim..... 500 g/L

Aditivos ..... c.s.p. 1 L

**Reg PQUA N° 795 - SENASA**

**Titular del Registro: BIOAGROCORP TRADING SAC**

Importado y Distribuido por:

**BIOAGROCORP TRADING SAC**



Av. Melgarejo N° 580 Dpto. 402  
Urb. Santa Patricia I Etapa - La Molina - Lima  
Teléfono: 348-0009

Fecha de Formulación:  
N° de Lote:  
**Contenido Neto: 500 ml**  
Fecha de Vencimiento:

Formulado por:  
HANGZHOU CHANGHE AGRICULTURAL CHEMICAL CO., LTD  
64 Riverside Wharf, Changhe Town, Hangzhou - Zhejiang  
CHINA



**NO CORROSIVO**



**INFLAMABLE**

**NO EXPLOSIVO**

**INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO:**

**FUNGIZIM 500 SC** es un fungicida sistémico de amplio espectro con acción portectora y curativa.

**FUNGIZIM 500 SC** impide el desarrollo de las hifas, la formación de apresorios y el crecimiento del micelio. Detiene el desarrollo del tubo germinativo provocando irregularidades en la división celular y dando lugar a células anormales que provocan la muerte del hongo.

**“CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO”**

| CULTIVO   | PLAGA        |                  | DOSIS     |           | P.C.<br>(días) | L.M.R.<br>(ppm) |
|-----------|--------------|------------------|-----------|-----------|----------------|-----------------|
|           | Nombre Común | Nombre Técnico   | L/200 L   | L/Ha      |                |                 |
| Mandarina | Moho gris    | Botrytis cinerea | 0.3       | 1.5       | 14             | 0.7             |
| Tomate    | Moho gris    | Botrytis cinerea | 0.3 - 0.5 | 0.6 - 1.0 | 7              | 0.5             |
| Vid       | Moho gris    | Botrytis cinerea | 0.2       | -         | 21             | 0.3             |

P.C.: Período de carencia (días)      L.M.R.: Límite máximo de residuos (ppm: partes por millón)

**FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN:** Aplicar **FUNGIZIM 500 SC** al observarse los pimeros síntomas de la enfermedad. Se recomienda hasta un máximo de 2 aplicaciones por cultivo/campaña/año.

**PERIODO DE REINGRESO:** No reingresar al campo tratado antes de 24 horas de realizada la aplicación.

**COMPATIBILIDAD:** **FUNGIZIM 500 SC** es compatible con la mayoría de pesticidas de uso frecuente excepto con aquellos de reacción fuertemente alcalina, ácida u oxidante.

**FITOTOXICIDAD:** **FUNGIZIM 500 SC** no es fitotóxico para los cultivos recomendados.

**RESPONSABILIDAD CIVIL:** El Titular del Registro garantiza que las características físico-químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.



**LIGERAMENTE PELIGROSO**

**CUIDADO**

