

15.0 cm

32.0 cm

LEA CUIDADOSAMENTE ESTA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO
"MANTÉNGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN:

- Ligeramente irritante ocular.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- Después de usar el producto, cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación y para ingresar al área tratada durante las primeras 24 horas.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas, ni forrajes.
- Realizar la aplicación siguiendo la dirección del viento.
- Ningún envase que haya contenido este producto debe utilizarse para contener o transportar alimentos ni agua.

PRIMEROS AUXILIOS:

- Grupo químico: Triazoles
- En caso de intoxicación llame al médico o lleve al paciente al médico y muéstrela la etiqueta.
- En caso de ingestión: no provocar vómito, pero no evitarlo si se produce en forma espontánea.
- En caso de contacto con la piel, retirar la ropa contaminada, lavar el área afectada con abundante agua y jabón, retirar al afectado de la zona tratada.
- En caso de contacto con los ojos: enjuagarlos con agua limpia y fresca durante 15 minutos y llevar al paciente al médico especialista: Oftalmólogo.
- No existe antídoto. Tratamiento sintomático.

TELÉFONOS DE EMERGENCIA:
CICOTOX: 0800 - 1 - 3040
CISPROQUIM: 328-7398
BIAGROCORP TRADING SAC: 478-2002
ESSALUD: 117

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS:

- Después de usar el contenido, enjuague tres veces el envase y vierta la solución en la mezcla de la aplicación y luego inutilícelo, triturándolo o perforándolo y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.



MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE:

- Peligroso para los peces e invertebrados acuáticos. No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en el sitio destinado por las autoridades para tal fin.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 5 metros.

TEBUGEM[®]
250 EW

FUNGICIDA AGRÍCOLA

EMULSION ACEITE EN AGUA - EW

COMPOSICIÓN:

Tebuconazole..... 250 g/L
Aditivos c.s.p. 1 L

Reg. PQUA N° 626 - SENASA
Titular del Registro: BIOAGROCORP TRADING S.A.C.

Importado y distribuido por:
BIOAGROCORP TRADING S.A.C.



Calle Los Flamencos N° 121 Interior 6 Santa Anita
Teléfono: 4782002 / Fax: 362-0014

Contenido neto: 200 L

N° de Lote:
F. de Form.:
F. de Venc.:

Formulado por:
SINOCHEN NINGBO LTD
21 Jiangxu St. Ningbo 315000
CHINA

NO CORROSIVO

NO INFLAMABLE

NO EXPLOSIVO

LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO



INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO:

TEBUGEM 250 EW es un fungicida sistémico, que pertenece al grupo de los Triazoles, con acción protectante y curativa. Actúa inhibiendo la síntesis del ergosterol produciendo el detenimiento del crecimiento y posterior muerte del hongo.

Se aplica en pulverizaciones, previa mezcla en agua. Se recomienda llenar el tanque hasta la mitad con agua y agregar **TEBUGEM 250 EW**, agitar continuamente y completar el resto del agua. Aplicar en forma de aspersión, con un equipo en perfecto estado y debidamente calibrado, según la dosis del cuadro adjunto.

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

CUADRO DE USOS:

CULTIVO	PLAGA		Dosis		P.C. (días)	L.M.R. (ppm)
	Nombre Común	Nombre Técnico	lt/ 200 lt	lt/ha		
Vid	Oidium	<i>Erysiphe necator</i>	0.06-0.1	0.3-0.5	21	2
Espárrago	Cercosporiasis	<i>Cercospora asparagi</i>	0.25	0.5	14	0.01
Pimiento	Oidium	<i>Leveillula taurica</i>	0.2	0.6	7	0.5
Papa	Tizon temprano	<i>Alternaria solani</i>	0.2	0.6	14	0.2
Café	Roya del café	<i>Hemileia vastatrix</i>	0.25-0.3	-	30	0.1

P.C.: Período de carencia

L.M.R.: Límites máximos de residuos

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN: Aplicar **TEBUGEM 250 EW** al observarse los primeros síntomas de la enfermedad, con un máximo de 2 aplicaciones por cultivo/campaña. En el caso de vid, especialmente al brotamiento y en el espárrago a la apertura de los filocladios, considerando en este cultivo un intervalo entre aplicaciones de 15 a 30 días.

PERIODO DE REINGRESO: No reingresar al campo tratado antes de 24 horas de realizada la aplicación.

COMPATIBILIDAD: **TEBUGEM 250 EW** es compatible con la mayoría de plaguicidas de uso frecuente excepto con aquellos de reacción fuertemente alcalina, ácida u oxidante.

FITOTOXICIDAD: **TEBUGEM 250 EW** no es fitotóxico para los cultivos recomendados.

RESPONSABILIDAD CIVIL: El Titular del Registro garantiza que las características físico-químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.

2.17 cm