

FOLPAN[®] 50 PM

FUNGICIDA AGRÍCOLA

POLVO MOJABLE (WP)

Composición Química:

Folpet 500 g/kg
Aditivos c.s.p. 1 kg

Reg N° 348-97-AG-SENASA

Titular del Registro:
 **Proficol**
PROFIANDINA PERÚ S.A.
Av. Alfredo Benavides N° 1555 Of. 404. Miraflores .
Lima - Perú. Telf.: (01) 641-0000 / 255-7190

Formulado por:
PROFICOL ANDINA B.V. SUCURSAL COLOMBIA
Calle 1 C N° 7-53 Interior Zona Franca
Barranquilla- Colombia.

Importado y Distribuido por :
PROFIANDINA PERÚ S.A.

Lote N°

CONTENIDO NETO: 1KILOGRAMO

Fecha de Formulación:

Fecha de Vencimiento:

NO CORROSIVO

NO INFLAMABLE

NO EXPLOSIVO

LIGERAMENTE PELIGROSO

CUIDADO

“LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO”

“MANTENGA EL PRODUCTO BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS”

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN:

- Este producto causa daño temporal a los ojos.
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua de consumo.
- Después de usar el producto báñese con abundante agua y jabón, cámbiese y lave la ropa contaminada
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.
- Almacenar el producto en lugares frescos y ventilados, lejos de la pared y sobre una parihuela.
- No almacenar el producto en casas de habitación.
- Utilizar equipo de protección durante la mezcla y aplicación y para re-ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- No re-ensasar o depositar el contenido en otros envases.
- Realizar la aplicación siguiendo la dirección del viento.

PRIMEROS AUXILIOS:

- Grupo químico: Ftalimida.
- En caso de presentarse síntomas de intoxicación llame al médico inmediatamente, o lleve al paciente al médico y muéstrole la etiqueta
- En caso de contacto con los ojos, lavarlos con abundante agua fresca durante 15 minutos. Si el dolor persiste consultar con un oftalmólogo.
- En caso de contacto con la piel, quitar la ropa contaminada y lavar toda la zona expuesta al producto con jabón suave y agua; a continuación enjuague con agua tibia. Consulte a un médico en caso de cualquier complicación.
- En caso de ingestión, no induzca al vómito. Lavar la boca con agua abundante. No administre nada oralmente si el paciente esta inconscientes.
- Consulte a un médico.
- En caso de inhalación, sacar a la víctima al aire libre y mantenerla abrigada y en reposo. Si se ha producido paro respiratorio dar respiración artificial. Si la respiración es dificultosa dar oxígeno. Llamar al médico.

NOTA AL MÉDICO:

Se desconoce antídoto específico. Tratamiento sintomático y terapia complementaria. En caso de ingestión hacer lavado gástrico y administrar carbono activado.

TELÉFONOS DE EMERGENCIA (líneas gratuitas)
CISPROQUIM: 080-050-847; CICOTOX : 0800- 1-3040
INFOSALUD: 0800-10-828

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS:

Después de usar el contenido destruya este envase y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE:

- Peligroso para animales domésticos, flora y fauna silvestre.
- Peligroso para los peces; no contaminar lagos, ríos, estanques o arroyos con los desechos vacíos
- No aplicar a menos de 5 m de las fuentes de agua en los cultivos anuales recomendados y no menos de 10 m en el cultivo de vid.
- No lavar el equipo ni la ropa utilizada en la aplicación de **FOLPAN 50 PM** en lugares cercanos a fuentes de agua.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o los sobrantes del producto.
- En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en el sitio destinado por las autoridades locales para este fin.

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO:

FOLPAN 50 PM es un fungicida no sistémico de amplio espectro de acción, que se utiliza en aplicaciones preventivas para el control de patógenos foliares, de flores y de frutos. Debido a que este producto actúa sobre varios sitios de acción en el hongo, la probabilidad de aparición de resistencia es baja. El ingrediente activo de **FOLPAN 50 PM** se degrada rápidamente en el medio ambiente no dejando residuos tóxicos.

Preparar una pre-mezcla diluyendo la dosis recomendada en un recipiente con agua, llevar esta solución al cilindro o mochila según sea el caso y completar con agua hasta alcanzar el volumen requerido, agitar continuamente y proceder a la aplicación.

FOLPAN 50 PM se aplica con cualquier equipo de pulverización terrestre de mochila a palanca o motor, o con dispositivos adaptados al tractor. Calibrar los equipos para evitar sobre o sub-dosificaciones. Realizar la aplicación con gotas finas y cobertura uniforme.

“CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO”

Cuadro de Usos

CULTIVO	ENFERMEDAD	DOSIS		P.C. (días)	LMR (ppm)
		Kg/200 L	Kg/ha		
CEBOLLA	“Mildiu” <i>Peronospora destructor</i>	0.5	1.0 - 1.5	7	2
ALGODÓN	“Oidium” <i>Erysiphe malachrae</i>	0.5 -1.0	1.0 - 2.0	-	-
MARIGOLD	“Mancha negra” <i>Alternaria solani</i>	0.5	1.0 - 1.5	7	-
PAPA	“Hielo fungoso/rancha” <i>Phytophthora infestans</i>	1.0	2.0 - 3.0	7	5
	“Mancha negra” <i>Alternaria solani</i>				
TOMATE	“Mancha negra” <i>Alternaria solani</i>	0.5	1.0 - 1.5	7	5
	“Podredumbre gris” <i>Botrytis cinerea</i>	0.5	1.0 - 2.0		
VID	“Podredumbre gris” <i>Botrytis cinerea</i>	0.5 - 1.0	1.5 - 2.0	7	25
ZAPALLO	“Oidium” <i>Erysiphe cichoracearum</i>	0.5 - 1.0	1.0 - 1.5	7	2

P.C.: Periodo de Carencia LMR: Límite Máximo de Residuos

FRECUENCIA Y MOMENTO DE APLICACIÓN:

Realizar como máximo 3 aplicaciones por campaña con un intervalo mínimo entre aplicaciones de 7 días. Las aplicaciones deben realizarse de forma preventiva, antes de la aparición de los síntomas de la enfermedad, cuando las condiciones climáticas favorezcan su desarrollo.

PERIODO DE REINGRESO:

No reingresar al área tratada, sin ropa de protección, durante 24 horas después de la aplicación.

COMPATIBILIDAD:

Compatible con la mayoría de plaguicidas agrícolas de uso común, salvo aquellos fuertemente alcalinos. No se debe emplear en combinación con aceite o poco después de la aspersión de aceite.

FITOTOXICIDAD:

No se han observado síntomas de fitotoxicidad en los cultivos y dosis recomendados.

RESPONSABILIDAD CIVIL:

El Titular del Registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las indicaciones e instrucciones dadas.

