

28,00 cm

LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO

MANTENGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO

Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.

No re-ensasar o depositar el contenido en otros envases.

Ningún envase que haya contenido el plaguicida debe utilizarse para conservar alimentos.

Realice el manipuleo y la aplicación utilizando los equipos de protección recomendados como guantes y botas de goma, pantalones largos, mandil y mascarilla.

Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación del producto.

No almacenar, ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.

Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.

Evitar ingerir el producto. Evite todo contacto directo.

PRIMEROS AUXILIOS

En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente, o lleve al paciente al médico y muéstrela la etiqueta.

En caso de contacto con los ojos, lave inmediatamente los ojos con una gran cantidad de agua corriente, manteniendo los párpados abiertos para enjuagar la totalidad de la superficie del ojo y de los párpados. Obtener atención médica.

En caso de contacto con la piel, inmediatamente retire la ropa contaminada y lavar la piel, el cabello y las uñas con agua y jabón. Obtener atención médica. Lavar la ropa contaminada antes de volver a usarlos.

NOTA AL MÉDICO

El producto no tiene antídoto específico. Proporcionar tratamiento sintomático.

En caso de emergencia llamar a los teléfonos:

CICOTOX: 080013040

Antalien SAC : (01) 445-7352

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES

Después de usar el contenido enjuague 3 veces el envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación, finalmente destrúyalo y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.

Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.

Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.

PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE

Es moderadamente peligroso para los peces.

En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en el sitio destinado por las autoridades locales para este fin.

No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.

No disponer con residuos municipales.

No aplicar directamente al suelo.



Sinoconazole® 250 EW

FUNGICIDA AGRÍCOLA

Emulsión, aceite en agua – EW

Composición Química:

Tebuconazole..... 250 g/L

Otros.....csp 1L

Registro PQUA N° 783 - SENASA

Titular del Registro: ANTALIEN SAC



Antalien
Calidad para la Agricultura

Importado y distribuido por:

ANTALIEN SAC

Calle Arica Nro. 125 Oficina. 401 – Miraflores - Lima

Teléfono: (01) 445-7352

Formulado por:

N° Lote: JIANGSU HIGH HOPE CORPORATION

F. de Form: 15 Hubu Street Nanjing, 210002, China

F. de Venc: Teléfono: +86 25 86895000 / Fax: +86 25 84400800

Contenido Neto: **1L**

NO INFLAMABLE

NO CORROSIVO

NO EXPLOSIVO

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

SINOCONAZOLE 250 EW es un fungicida sistémico de amplio espectro de acción, protectora, curativa y erradicante.

SINOCONAZOLE 250 EW se absorbe rápidamente por las partes vegetativas de la planta con traslocación principalmente acropétala a toda la superficie de las hojas y frutos.

SINOCONAZOLE 250 EW actúa inhibiendo la biosíntesis del ergosterol fungoso por demetilación. Su actividad fungitóxica es sobre la demetilación de los carbonos C14 y C4. Esta acción causa pérdidas de los constituyentes citoplásmicos esenciales.

PREPARACIÓN Y APLICACIÓN

Verter la dosis a usar en un envase de agua, de tal modo que se forme una suspensión uniforme. Llenar el tanque hasta la mitad con agua limpia y poner los agitadores en marcha, luego agregar la suspensión uniforme de SINOCONAZOLE 250 EW preparada y finalmente completar el llenado del tanque con agua.

No hacer aplicaciones con alta temperatura ambiental. No aplique contra el viento ni cuando las condiciones favorezcan la deriva. No Aplicar en horas de calor y dirigir la aplicación al follaje.

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

USOS Y DOSIS

Cultivo	Plaga	Dosis	PC (días)	LMR (ppm)
Espárrago	Roya (<i>Puccinia asparagi</i>)	0,5 L/ha	14	0,05

PC: Período de carencia / **LMR:** Límite máximo de residuos

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN: El número máximo de aplicaciones debe ser de 2 aplicaciones/campaña/año. El intervalo entre aplicaciones debe ser mínimo 15 días, dependiendo de la severidad de la enfermedad y siempre y cuando continúen las condiciones favorables para el desarrollo de ésta.

PERIODO DE REINGRESO: Se puede ingresar al área tratada después de 12 horas.

COMPATIBILIDAD: SINOCONAZOLE 250 EW es compatible con la mayoría de los plaguicidas, sin embargo es recomendable siempre antes de hacer una mezcla comprobar la compatibilidad física.

FITOTOXICIDAD: No presenta fitotoxicidad en los cultivos para los cuales se recomienda, si se siguen las instrucciones de la etiqueta.

RESPONSABILIDAD CIVIL: El titular del registro garantiza que las características físico-químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines recomendados si se usa y maneja de acuerdo a las condiciones e instrucciones dadas.



**LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO**



14,60 cm