

20,00 cm

**LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO.  
MANTENGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE  
LOS NIÑOS**

#### PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO

- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación del producto.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- No almacenar, ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- No re-ensavar o depositar el contenido en otros envases.
- No utilizar el envase vacío para almacenar bebidas ni alimentos.
- Realice el manipuleo y la aplicación utilizando los equipos de protección recomendados como guantes y botas de goma, pantalones largos, mandil y mascarilla.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

#### PRIMEROS AUXILIOS

- Grupo químico: Triazole
- En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente, o lleve al paciente al médico y muéstrela la etiqueta.
- En caso de contacto con los ojos lavarlos con abundante agua fresca por 15 minutos.
- En caso de contacto con la piel, lavarse inmediatamente con abundante agua y jabón.
- En caso de ingestión, no inducir al vómito. Si el paciente está inconsciente no dar nada por vía oral. Mantener la respiración.
- En caso de inhalación, retirar a la persona del área contaminada y trasladarla a un lugar con aire fresco. Brindar respiración artificial si fuese necesario.
- El producto no tiene antidoto específico. Proporcionar tratamiento sintomático.
- En caso de emergencia llamar a los teléfonos:

CICOTOX: 0-800-1-3040 / ESSALUD: 117 (gratuito)  
CISPROQUIM: 0-800-5-0847

#### MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

- Después de usar el contenido enjuague 3 veces el envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación, finalmente destrúyalo y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.



#### MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE

- Peligroso para peces.
- No contaminar ríos, lagos, estanques, arroyos u otras fuentes de agua con los desechos, restos de la aplicación, sobrantes del producto o envases vacíos.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 10 metros.
- No enterrar los envases ni los desechos del producto en el suelo.
- No aplicar en zonas con napas freáticas superficiales o en suelos altamente permeables.
- Peligroso para animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el ambiente.
- En caso de derrames, recoger el producto inmediatamente y depositarlo en sitios destinados por las autoridades locales para este fin.

## Sinoconazole® 250 EW

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

**FUNGICIDA AGRÍCOLA**

EMULSIÓN, ACEITE EN AGUA - EW

#### Composición:

Tebuconazole ..... 250 g/L  
Aditivos ..... c.s.p. 1 L

**Registro PQUA N° 783 - SENASA**

**Titular del Registro: ANTALIEN SAC**

Av. Las Gaviotas N° 160, Dpto. A706, Urbanización La  
Campiña Zona Dos - Chorrillos - Lima - Lima.  
Teléfono: +51 946 279 994

#### Formulado por:

**NANJING ESSENCE FINE CHEMICAL Co., Ltd.**  
Piso 5, N° 18 Suove Road Nanjing 210017, P.R.China.  
Teléfono: 86 25 86455862 / 86455863

#### Importado y distribuido por: EQUILIBRA PERÚ S.A.

Av. Circunvalación Del Club Golf Los Incas N° 134, Interior  
N° 1107, Urb. Del Club Golf Los Incas. Santiago de Surco.  
Lima. Lima. Teléfono: (01) 513 5353  
Móvil: 920014277 / 985026315



**EQUILIBRA**

N° de Lote:  
F. de Form:  
F. de Venc:

Contenido Neto:  
**10 L**

**NO INFLAMABLE**

**NO CORROSIVO**

**NO EXPLOSIVO**

#### INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

**SINOCONAZOLE® 250 EW** es un fungicida sistémico de amplio espectro de acción protectora, curativa y erradicante.

**SINOCONAZOLE® 250 EW** se absorbe rápidamente por las partes vegetativas de la planta con traslocación principalmente acropétala a toda la superficie de las hojas y frutos.

**SINOCONAZOLE® 250 EW** actúa inhibiendo la biosíntesis del ergosterol fungoso por demetilación. Su actividad fungitóxica es sobre la demetilación de los carbonos C14 y C4. Esta acción causa pérdidas de los constituyentes citoplásmicos esenciales.

Para la preparación verter la dosis a usar en un envase de agua, de tal modo que se forme una suspensión uniforme. Llenar el tanque hasta la mitad con agua limpia y poner los agitadores en marcha, luego agregar la suspensión uniforme de **SINOCONAZOLE® 250 EW** preparada y finalmente completar el llenado del tanque con agua.

**“CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO”**

#### CUADRO DE USOS

| Cultivo   | Plaga            |                               | Dosis |         | PC<br>(días) | LMR<br>(ppm) |
|-----------|------------------|-------------------------------|-------|---------|--------------|--------------|
|           | Nombre común     | Nombre científico             | L/ha  | L/200 L |              |              |
| Espárrago | Roya             | <i>Puccinia asparagi</i>      | 0,5   |         | 14           | 0,05         |
|           | Mancha del peral | <i>Stemphylium vesicarium</i> |       | 0,2     | 21           | 0,02         |
|           | Cercosporiasis   | <i>Cercospora asparagi</i>    | 0,55  |         | n.a          | 0,02         |
|           | Páprika          | <i>Leveillula taurica</i>     |       | 0,2     | 7            | 0,6          |
| Vid       | Oidiosis         | <i>Erysiphe necator</i>       |       | 0,1     | 14           | 0,5          |
|           | Podredumbre gris | <i>Botrytis cinerea</i>       |       | 0,2     |              |              |
| Alcachofa | Podredumbre gris | <i>Botrytis cinerea</i>       | 0,4   |         | 7            | 0,6          |

**PC:** Periodo de Carenia (días) / **LMR:** Límites Máximos de Residuos (ppm)

**FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN:** El número máximo de aplicaciones debe ser de 2 aplicaciones/campaña/año. El intervalo entre aplicaciones debe ser de 9 a 15 días, dependiendo de la severidad de la enfermedad y siempre y cuando continúen las condiciones favorables para el desarrollo de ésta.

**PERIODO DE REINGRESO:** Se puede ingresar al área tratada después de 12 horas.

**COMPATIBILIDAD:** **SINOCONAZOLE® 250 EW** es compatible con la mayoría de los plaguicidas, sin embargo es recomendable siempre antes de hacer una mezcla comprobar la compatibilidad física.

**FITOTOXICIDAD:** No presenta fitotoxicidad en los cultivos para los cuales se recomienda, si se siguen las instrucciones de la etiqueta.

**RESPONSABILIDAD CIVIL:** El titular del registro garantiza que las características físico-químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines recomendados si se usa y maneja de acuerdo a las condiciones e instrucciones dadas.

18,00 cm



**LIGERAMENTE PELIGROSO  
CUIDADO**

