

LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO

“Manténgase bajo llave fuera del alcance de los niños”

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN:

FURIA pertenece al grupo químico Piretroides.

- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.
- No aplique el producto en presencia de vientos fuertes o en las horas de mayor frecuencia.
- Manténgase alejado del calor y flama abierta.

CONDICIONES DE MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS:

- Después de usar el contenido, enjuague tres veces el envase y vierta la solución en la mezcla de la aplicación y luego inutilícelo, triturándolo o perforándolo y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.



PRIMEROS AUXILIOS:

- En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente o lleve al paciente al médico y muéstrele la etiqueta. No provoque el vómito.
- En caso de contacto con los ojos, lávese con abundante agua fresca y si el contacto fuese con la piel, lávese con abundante agua y jabón. Si hay irritación y persiste consultar con un médico.

En caso de intoxicación no provoque vómito. Acuda al médico a la brevedad posible. Antídoto: Si se ingiere hacer lavados gástricos y con mucho cuidado. Un catártico salino (Sulfato de Magnesio) 15 a 30 gramos disuelto en agua deberá ser dado. También usar 15 a 20 gramos de carbón activado en un poco de agua.

TELÉFONOS PARA EMERGENCIA EN CASO DE INTOXICACIÓN:
CICOTOX: 0800-1-3040

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE:

No debe contaminarse ríos, lagos, estanques u otras fuentes de agua superficiales o subterráneas con este producto, ni con envases o empaques vacíos. Tóxico para los animales domésticos y fauna silvestre. Tóxico para peces.

Furia®

INSECTICIDA AGRÍCOLA

Concentrado Emulsionable (EC)
Zeta-cypermethrin 180 g/L
Aditivos 816 g/L

Reg. Producto N° 311-96-AG-SENASA

Titular del Registro: FMC Latinoamerica S.A. Sucursal

Fabricante y Formulador:

FMC Corporation
Agricultural Products Group
1735 Market Street - Philadelphia, PA 19103 - USA



Importador

FARMAGRO S.A.
Av. Alfredo Mendiola 6068, Los Olivos - Lima, PERÚ
Teléfono: 6141500 Fax: 6141517

FARMAGRO
MEJORES PRODUCTOS PARA MEJORES COSECHAS

Fecha de Formulación:
Fecha de vencimiento:
N° de lote:
Contenido neto: 1 L.



NO EXPLOSIVO NO CORROSIVO INFLAMABLE



Moderadamente peligroso
DAÑINO

© Marca registrada de FMC

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO: FURIA es un insecticida piretroide sintético. Actúa por ingestión y contacto.

Para preparar la mezcla, llenar con agua el tanque de aplicación hasta la mitad, agregue la cantidad de FURIA recomendado agitando bien y completar luego con más agua.

“Consulte con un Ingeniero Agrónomo”

USOS Y DOSIFICACIONES RECOMENDADAS:

| CULTIVOS | PLAGAS | | DOSIS | | P.C. | L.M.R. (ppm) |
|--|-------------------------|-----------------------------------|-----------|-----------|---|--------------|
| | Nombre Común | Nombre Científico | mL/200L | mL/ha | | |
| ALGODÓN | Arrebiatado | <i>Dysdercus peruvianus</i> | 250* | 250* | 7 | 0,05 - 0,5 |
| PAPA | Mosca Minadora (adulto) | <i>Liriomyza huidobrensis</i> | 75 - 150 | 150 - 300 | 7 | 0,05 |
| | Gorgojo de los Andes | <i>Prennotrypes sp</i> | 200 | | | |
| | Pulgilla Saltona | <i>Epitrix sp.</i> | 200 | | | |
| AJO | Thrips | <i>Thrips tabaci</i> | 150 - 200 | | 7 | 0,05 |
| MARIGOLD | Mosca Barrenadora | <i>Melanagromyza sp.</i> | 200 | | 7 | 0,05 |
| MAÍZ | Gusano de Tierra | <i>Spodoptera frugiperda</i> | 150 - 200 | | 7 | 0,05 |
| | | <i>Agrotis, Feltia y Prodenia</i> | 250 | | | |
| ESPARRAGO | Gusano de Tierra | <i>Agrotis, Feltia y Prodenia</i> | 250 | | 7 | 0,05 |
| FRIJOL | Gusano de Tierra | <i>Agrotis, Feltia y Prodenia</i> | 250 | | 7 | 0,05 |
| | Cigarrita | <i>Empoasca sp.</i> | 300 | | | |
| ALCACHOFA | Spodoptera | <i>Spodoptera eridania</i> | 150 - 200 | | n.d. | n.d. |
| | Mosca Minadora | <i>Liriomyza huidobrensis</i> | 100 - 150 | | n.d. | n.d. |
| CRISANTEMO | Pulgón | <i>Aphis gossypii</i> | | 300 | n.d. | n.d. |
| ROSA | Pulgón | <i>Macrosiphum rosae</i> | | 300 | n.d. | n.d. |
| PIMIENTO | Gusano defoliador | <i>Spodoptera eridania</i> | 150 - 200 | | n.d. | 0,2 |
| CEBOLLA | Thrips | <i>Thrips tabaci</i> | 150 - 200 | | n.d. | 0,1 |
| ALMACENAJE DE TUBERCULOS, SEMILLAS Y GRANOS ALMACENADOS | | | | | | |
| PAPA | Polilla | <i>Phthorimaea operculella</i> | 150 | | Desinfección del almacén antes de depositar los tubérculos. | |
| FRIJOL | Gorgojo del Frijol | <i>Zabrotes subfasciatus</i> | 200 | | Aplicar antes de envasar. | |
| MAÍZ | Gorgojo del Maíz | <i>Sitophilus oryzae</i> | 200 | | | |

* Usar bomba de motor;
L.M.R. = Límite máximo de residuos en p.p.m.;

P.C. = Última aplicación a la cosecha en días;
n.d. = No determinado

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN: Dependiendo del nivel de infestación de la plaga, las aplicaciones se pueden realizar con una frecuencia de 7 a 10 días.

PERÍODO DE REINGRESO AL ÁREA TRATADA: 24 Horas.

COMPATIBILIDAD: FURIA es compatible con plaguicidas de uso común, excepto con los de reacción alcalina.

FITOTOXICIDAD: FURIA no presenta efectos fitotóxicos en los cultivos y en las dosis aquí señaladas.

RESPONSABILIDAD CIVIL:

“El titular del registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas”.

