

**LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO**

**"MANTENGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"**

**PRECAUCIONES, ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN**

- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.
- No aplique el producto en presencia de vientos fuertes o en las horas de mayor frecuencia.
- Manténgase alejado del calor y flama abierta.

**PRIMEROS AUXILIOS**

- Grupo químico: Piretroides
  - En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente o lleve al paciente al médico y muéstrela la etiqueta. No provoque el vómito.
  - En caso de contacto con los ojos, lávese con abundante agua fresca y si el contacto fuese con la piel, lavarse con abundante agua y jabón. Si hay irritación y persiste consultar con un médico.
  - En caso de intoxicación no provoque vómito. Acuda al médico a la brevedad posible.
- Antídoto:** Si se ingiere hacer lavados gástricos y con mucho cuidado. Un catártico salino (Sulfato de Magnesio) 15 a 30 gramos disuelto en gua deberá ser dado. También usar 15 a 20

**TELÉFONO DE EMERGENCIA EN CASO DE INTOXICACIÓN**

CICOTOX: 0800-1-3040  
ESSALUD: 0801-10200

**MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS**

- Después de usar el contenido, enjuague tres veces el envase y vierta la solución en la mezcla de la aplicación y luego inutilícelo, triturándolo o perforándolo y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.



**MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE**

- Peligroso para organismos acuáticos
- No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- El producto no debe aplicarse en zonas con napas freáticas superficiales o en suelos altamente permeable.
- Respetar una banda no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 10 metros.
- Peligroso para animales doméstico, fauna y flora silvestre.
- No permitir animales en el área tratada.
- En caso de derrame recoger el producto debe ser recopilado inmediatamente y dispuesto en un lugar seguro destinado por las autoridades locales para este fin.

# Furia®

**PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA**

**INSECTICIDA AGRICOLA**

**Concentrado Emulsionable (EC)**

**Composición:**

Zeta - cypermethrin.....180 g/L  
Aditivos .....c.s.p 1L

**Reg. Producto N° 311-96-AG-SENASA**

Titular del Registro:

**FMC Latinoamerica S.A. Sucursal**  
Av. Republica de Panamá 3531  
Int. 1203, San Isidro -Lima



Formulador :

**FMC Corporation**  
Agricultural Products Group  
1735 Market Street -Philadelphia,

**Importado y distribuido por :**

FARMAGRO S.A  
Av. Alfredo Mendiola 6068, Los Olivos – Lima, PERÚ  
Teléfono: 6141500 Fax: 6141517

**FARMAGRO**

MEJORES PRODUCTOS PARA MEJORES COSECHAS

Fecha de Formulación:

Fecha de Vencimiento:

N° de lote:

Contenido neto: 1L



**NO CORROSIVO INFLAMABLE NO EXPLOSIVO**



© Marca registrada de FMC

**MODERADAMENTE PELIGROSO DAÑINO**

**INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO**

**FURIA** es un insecticida piretroide sintético. Actúa por ingestión y contacto. Para preparar la mezcla, llenar con agua el tanque de aplicación hasta la mitad, agregue la cantidad de **FURIA** recomendado agitando bien y completar luego con más agua.

**"Consulte con un Ingeniero Agrónomo"**

CULTIVOS	PLAGAS		DOSIS		P.C.	L.M.R. (ppm)
	Nombre Común	Nombre Científico	mL/200L	mL/ha		
ALGODÓN	Arrebiatado	<i>Dysdercus peruvianus</i>	250*	250*	7	0,05 - 0,5
PAPA	Mosca Minadora (adulto)	<i>Liriomyza huidobrensis</i>	75 - 150	150 - 300	7	0,05
	Gorgojo de los Andes	<i>Prennotyphes sp</i>	200			
	Pulgilla Saltona	<i>Eptitrix sp.</i>	200			
AJO	Thrips	<i>Thrips tabaci</i>	150 - 200		7	0,05
MARIGOLD	Mosca Barrenadora	<i>Melanagromyza sp.</i>	200		7	0,05
MAÍZ	Cogollero	<i>Spodoptera frugiperda</i>	150 - 200		7	0,05
	Gusano de Tierra	<i>Agrotis, Feltia y Prodenia</i>	250			
ESPARRAGO	Gusano de Tierra	<i>Agrotis, Feltia y Prodenia</i>	250		7	0,05
FRIJOL	Gusano de Tierra Cigarrita	<i>Agrotis, Feltia y Prodenia</i>	250		7	0,05
		<i>Empoasca sp.</i>	300			
ALCACHOFA	Spodoptera	<i>Spodoptera eridania</i>	150 - 200		n.d.	n.d.
	Mosca Minadora	<i>Liriomyza huidobrensis</i>	100 - 150		n.d.	n.d.
CRISANTEMO	Pulgón	<i>Aphis gossypii</i>		300	n.d.	n.d.
ROSA	Pulgón	<i>Macrosiphum rosae</i>		300	n.d.	n.d.
PIMIENTO	Gusano defoliador	<i>Spodoptera eridania</i>	150 - 200		n.d.	0,2
CEBOLLA	Thrips	<i>Thrips tabaci</i>	150 - 200		n.d.	0,1
<b>ALMACENAJE DE TUBERCULOS, SEMILLAS Y GRANOS ALMACENADOS</b>						
PAPA	Polilla	<i>Pthorimaea operculella</i>	150			Desinfección del almacén antes de depositar los tubérculos.
FRIJOL	Gorgojo del Frijol	<i>Zabrotes subfasciatus</i>	200			Aplicar antes de envasar.
MAÍZ	Gorgojo del Maíz	<i>Sitophilus oryzae</i>	200			

\*Usar bomba a motor;

P.C.= Última aplicación a la cosecha en días.

L.M.R.= Limite máximo de residuos en p.p.m.;

n.d.= No determinado

**FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN:** Dependiendo del nivel de infestación de la plaga, las aplicaciones se pueden realizar con una frecuencia de 7 a 10 días.

**TIEMPO DE REINGRESO AL ÁREA TRATADA :** 24 Horas.

**COMPATIBILIDAD:** Furia es compatible con plaguicidas de uso común, excepto con los de reacción alcalina.

**FITOTOXICIDAD:** Furia no representa efectos fitotóxicos en los cultivos y en las dosis aquí señaladas.

**RESPONSABILIDAD CIVIL**

"El titular del registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas".

