

“MANTENGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS”

# AMICAL® 50 WG

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

**FUNGICIDA AGRÍCOLA**

**GRÁNULOS DISPERSABLES (WG)**

Composición:

Azoxystrobin ..... 500 g/Kg  
Aditivos..... csp 1 Kg

Registro PQUA N° 806 - SENASA

Titular del Registro, Importador y Distribuidor:



**AGRO KLINGE S.A.**

Av. EL Derby 254. Int 306. Santiago de Surco.  
Lima-Perú. Telf.: (01) 641-0000

Formulado por:

**BETA CHEMICALS LTD.**

Rm.707, Blk. A, Kingsound Center,  
No. 116 Zizhuyuan Road, Beijing 100097, China

N° de Lote:  
Fecha de Formulación:  
Fecha de Vencimiento:

**Contenido Neto: 1 Kg**

**NO CORROSIVO**

**NO INFLAMABLE**

**NO EXPLOSIVO**

**LIGERAMENTE PELIGROSO  
CUIDADO**

18.5 cm

0.8 cm

0.8 cm

18 cm

0.8 cm

**"LEA CUIDOSAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO"  
"MANTÉNGASE BAJO LLAVE Y FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"**

**PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN:**

- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación. El producto es irritante para los ojos y la piel. Evite el contacto directo. El producto es nocivo por ingestión, contacto con la piel o por inhalación. Conservar el producto en el envase original, etiqueta doycerrado; en lugares secos y ventilados, lejos del calor. No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes. Después de usar el producto cámbiese, lávela ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación (guantes de goma, delantal, botas de goma, gafas, careta, gorro, máscara contra el polvo, respirador u otros), y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas. Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizar para conservar alimentos.

**INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS:**

**Grupo Química: Estrobilurina**

- En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente o lleve al paciente al médico y muéstrela una copia de esta etiqueta.
- Su ingestión produce síntomas de intoxicación como dolor de cabeza, vértigo, debilidad, constricción de las pupilas, visión borrosa, excesiva salivación, sudoración, calambres abdominales, náusea y vómito.
- En caso de ingestión induzca el vómito introduciendo un dedo en la garganta o dando de beber agua tibia con sal. No dar de beber leche ni productos que contengan aceites.
- En caso de contacto con los ojos lavarlos con abundante agua fresca por lo menos durante 15 minutos y si el contacto fuese con la piel, lavarse con abundante agua y jabón. Si persiste la irritación acudir a un centro de asistencia médica.
- En caso de inhalación, mantener al paciente al aire libre, en reposo y abrigado, hasta que llegue el médico.
- No dar de beber nada a un paciente que se encuentre inconsciente.

**Teléfono de emergencia:** SAMU: 106. AGRO KLINGES.A.: (01) 641-0000.

**CONDICIONES DE MANEJO Y DE DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS:**

Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe reutilizarse. Después de usar el contenido inutilice la funda o bolsa cortándola. Entréguela o deposítela en el lugar de destino dispuesto por la autoridad competente, para su gestión.

**MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE**

Peligroso para organismos acuáticos. No contaminar fuentes de agua, lagos, ríos, estanques, arroyos con los restos de la aplicación, sobrantes o envases vacíos. Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 5 metros. Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada. El producto no debe aplicarse en zonas con napas freáticas superficiales. En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin.

© Marca Registrada

**INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO:** AMICAL 50 WG es un fungicida sistémico de acción protectante, curativo y antiesporulante. El azoxystrobin inhibe la germinación de las esporas y el crecimiento del micelio del hongo, tiene una sistemía lenta, actúa más localmente, es translaminar algo acropétalo. Azoxystrobin tiene óptima eficacia cuando se aplica preventiva o tempranamente en la aparición de síntomas por su control a la germinación de esporas. Se emplea en pulverizaciones en mezcla con agua. Aplicar con equipos de aspersión terrestre, utilizando el volumen de agua suficiente para cubrir uniformemente el follaje.

**"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"**

Cultivo	Plaga		Dosis		P.C. (días)	LMR (PPM)
	Nombre común	Nombre Científico	kg/200 L	kg/ha		
Espárrago	"Mancha púrpura"	<i>Stemphylium versicarium</i>	0.1	0.25	100	0.04
Vid	"Oidiosis"	<i>Erysiphe necator</i>	0.1	-	14	2
Páprika	"Oidium"	<i>Leveillula taurica</i>	0.06 - 0.08	-	3	3

**LMR = Límite máximo de residuos. P.C. = Período de carencia**

**Frecuencia y época de aplicación:** Para una mayor eficiencia, debe ser aplicado de manera preventiva a la observación de los primeros síntomas de la enfermedad:

- Una (01) aplicación por campaña, considerando una (01) campaña por año para pprika.
- Mximo dos (02) aplicaciones por campaña, considerando una (01) campaña para vid y dos (02) campañas para esprrago.

**Periodo de ingreso:** 24 horas


**Compatibilidad:** Compatible con la mayoría de los plaguicidas usados, sin embargo, se recomienda efectuar una prueba antes de la mezcla definitiva.

**Fitotoxicidad:** No es fitotxico en las dosis y cultivos recomendados.

**RESPONSABILIDAD CIVIL:** El titular del registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aqu recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las indicaciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor informacin comuniquese con el titular de registro o con el distribuidor del producto."

18.5 cm

0.8 cm



0.8 cm

18 cm

0.8 cm