

"MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

AMICAL[®] 50 WG

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

FUNGICIDA AGRÍCOLA

GRÁNULOS DISPERSABLES (WG)

Composición:

Azoxystrobin 500 g/Kg
Aditivos..... csp 1 Kg

Registro PQUA N° 806 - SENASA

Importador y Distribuidor:



AgroKlinge

A member of ADAMA

AGRO KLINGE S.A.

Av. EL Derby 254. Int 306. Santiago de Surco.
Lima-Perú. Telf.: (01) 641-0000

Titular del Registro:

ADAMA AGRICULTURE PERU S.A.

Av. EL Derby 254. Int 306. Santiago de Surco.
Lima-Perú. Telf.: (01) 641-0000

Formulado por:

BETA CHEMICALS LTD.

Rm.707, Blk. A, Kingsound Center,
No. 116 Zizhuyuan Road, Beijing 100097, China

Fecha de Formulación:
N° de Lote:
Fecha de vencimiento:

Contenido Neto: 1 Kg

NO CORROSIVO

NO INFLAMABLE

NO EXPLOSIVO

**LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO**

0.8 cm

18 cm

0.8 cm

18.5 cm

"LEA CUIDOSAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO"
"MANTÉNGASE BAJO LLAVE Y FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN:

- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación. El producto es irritante para los ojos y la piel. Evite el contacto directo. El producto es nocivo por ingestión, contacto con la piel o por inhalación. Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado; en lugares secos y ventilados, lejos del calor. No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas, no forrajes. Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación (guantes de goma, delantal, botas de goma, gafas, careta, gorro, máscara contra el polvo, respirador u otros), y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas. Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.
- Ningún envase que haya contenido plaguicida debe utilizarse para conservar alimentos.

INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS:

Grupo químico: Estrobirulina

- En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente o lleve al paciente al médico y muéstrele una copia de esta etiqueta.
- Su ingestión produce síntomas de intoxicación como dolor de cabeza, vértigo, debilidad, constricción de las pupilas, visión borrosa, excesiva salivación, sudoración, calambres abdominales, náuseas y vómitos.
- En caso de ingestión induzca el vómito introduciendo en la garganta o dando de beber agua tibia con sal. No dar de beber leche ni productos que contengan aceites.
- En caso de contacto con los ojos lavarlos con abundante agua fresca por lo menos durante 15 minutos y si el contacto fue con la piel, lavarse con abundante agua y jabón. Si persiste la irritación acudir a un centro de asistencia médica.
- En caso de inhalación, mantener al paciente al aire libre, en reposo y abrigado, hasta que llegue el médico.
- No dar de beber nada a un paciente que se encuentra inconsciente.

Teléfono de emergencia: SAMU: 106.

ADAMA AGRICULTURE PERU S.A.: (01) 641-0000.

CONDICIONES DE MANEJO Y DE DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS:

Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe re-utilizarse. Después de usar el contenido inutilice la funda o bolsa contándola. Entréguela o deposítela en el lugar de destino dispuesto por la autoridad competente, para su gestión.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE

Peligroso para organismos acuáticos. No contaminar fuentes de agua, lagos, ríos, estanques, arroyos, con los restos de la aplicación sobrantes o envases vacíos. Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 5 metros. Peligros para los animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada. El producto no debe aplicarse en zonas con napas freáticas superficiales. En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin.

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO:

AMICAL 50 WG es un fungicida sistémico de acción protectante, curativo y antiesporulante. El azoxystrobin inhibe la respiración mitocondrial bloqueando el transporte de electrones, tiene una sistemia lenta, se mueve principalmente de forma translinar, algo acropétala. Azoxystrobin tiene óptima eficacia cuando se aplica preventiva o tempranamente en la aparición de síntomas por su control a la germinación de esporas. Se emplea en pulverizaciones en mezcla con agua. Aplicar con equipos de aspersión terrestre, utilizando el volumen de agua suficiente para cubrir uniformemente el follaje.

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

Cultivo	Plaga		Dosis		P.C. (días)	LMR (PPM)
	Nombre común	Nombre científico	kg/200 L	Kg/ha		
Espárrago	"Mancha púrpura"	<i>Stemphylium versicarium</i>	0.1	0.25	100	0.04
Páprika	"Oidium"	<i>Leveillula taurica</i>	0.06 - 0.08	-	3	3
Vid	"Oidiosis"	<i>Erysiphe necator</i>	0.1	-	14	2

LMR.= Límite máximo de residuos. P.C.= Período de carencia

Frecuencia y época de aplicación: Para una mayor eficiencia, debe ser aplicado de manera preventiva a la observación de los primeros síntomas de la enfermedad:

- Una (01) aplicación por campaña, considerando una (01) campaña por año para páprika.
- Máximo dos (02) aplicaciones por campaña, considerando una (01) campaña para vid y dos (02) campañas para espárrago.

Periodo de reingreso: 24 horas

Compatibilidad: Compatible con la mayoría de los plaguicidas usados, sin embargo, se recomienda efectuar una prueba antes de la mezcla definitiva.

Fitotoxicidad: No es fitotóxico en las dosis y cultivos recomendados.

RESPONSABILIDAD CIVIL: El titular del registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las indicaciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular de registro o con el distribuidor del producto."

© Marca Registrada



0.8 cm

18 cm

0.8 cm

73.87 mm

74.55 mm