

28 cm

RAMBLA 5% EC

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

INSECTICIDA AGRÍCOLA

CONCENTRADO EMULSIONABLE (EC)

Composición:

Lambda cyhalotrin..... 50 g/L

Aditivos csp 1L

Reg. POUA Nº 804 - SENASA

Tiular del Registro:
SHARDA PERU S.A.C
Calle Las Castañas 138
Urb. El Palomar, San Isidro
Teléfono: 222-2695

Importado y distribuido por:
Kaliptra
Inversiones y Negocios Agrícolas
S.A.C.

Formulado por:
GUILARAT AGROCHEM LTD
Jhaver Centre, R.A., Building,
IV Floor, 72, Marshalls Road,
Egmore, Chennai 600 008, India
Telf.: +91-44-2007422
Mobile: +919884258165

INVERSIONES KALIPTRA S.A.C.
Calle Joaquín Bernal 764 Of. 102
Urb. Risco - Lima,
Teléfono: 4720746 / 983513048
Correo: ventas@inversioneskaliptra.com

Contenido Neto: 1L

Lote N°:

Fecha de Form.:

Fecha de Venc.:

NO CORROSIVO NO INFLAMABLE NO EXPLOSIVO



MODERADAMENTE PELIGROSO
DANINO



LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO
"MANTENGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"
PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- Tóxico por ingestión e inhalación.
- Es irritante a los ojos y a la piel.
- No exponer a mujeres embarazadas en la mezcla ni aplicación del producto debido al contenido de selenio.
- Usar equipo de protección ocular, dérmica y traje de seguridad completo.
- No reutilizar envases vacíos para almacenar alimentos filibaldas.
- No comer beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Conservar el producto en el envase original etiquetado y cerrado.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.
- Utilizar ropa protectora durante el manipuleo y aplicación para ingresar al área tratada en las primeras 48 horas.
- Realice las aplicaciones siguiendo la dirección del viento.

PRIMEROS AUXILIOS

- Grupo Químico: Pictoides
- En caso de intoxicación oral o inhalatoria, llamar al médico inmediatamente, o lleve al paciente al médico y mostrele la etiqueta.
- En caso de contacto con los ojos lavarlos con abundante agua fresca y si el contacto fuese con la piel lavarlos con abundante agua y jabón. Lleve al paciente al médico.
- No dar de beber nada a un paciente que se encuentre inconsciente.
- Noa al médico: no tiene antídoto específico, seguir tratamiento sintomático y de soporte.

TELÉFONOS DE EMERGENCIA
CICOTOX: 08007-3041 (gratuito) / 328-7398
Infsalud 0800-10828 (emergencia 24 horas)
ESSALUD EN LINEA: 411-8000 CISPROMQUIM: 0800-50847



MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

- Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y verter la solución en la mezcla de aplicación.
- Devuelva el envase sellado al centro de acopio autorizado.
- Realizar Obligatoriamente el triple lavado del presente envase.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE

- Peligroso para acorjes u otros artrópodos beneficios. No aplicar en época de floración.
- No contaminar lagos, ríos, arroyos o arroyos con los desechos y envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobranles del producto.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuencos de agua de al menos 5 metros, en el área tratada.
- Peligroso para las aves domésticas, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en el sitio destinado por las autoridades locales para este fin.
- Este producto no debe aplicarse en zonas con napas freáticas superficiales o en suelo altamente permeables.



INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

RAMBLA 5% EC es un insecticida piretroide no sistémico que actúa por ingestión y contacto.
RAMBLA 5% EC se aplica en aspersión con cualquier equipo de aplicación terrestre, debiendo emplearse suficiente cantidad de agua para lograr una buena cobertura de las plantas, para ello realizar la calibración del equipo. Usar corrector de pH, cuando el agua de preparación de la mezcla es igual o superior a pH 7.

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

CULTIVO	PLAGA		DOSIS		R.C. (días)	L.M.R. (ppm)
	Nombre Común	Nombre Técnico	L/200L	L/ha		
Tomate	"Chusano perforador"	Tela aluvial	0,1-0,2	0,2-0,4	5	0,1

L.M.R.: Límite máximo de residuos (ppm; partes por millón)

R.C.: Período de carencia (días)

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN

Se recomienda realizar 2 aplicaciones por campaña como máximo, haciendo un intervalo entre aplicación de 7 a 14 días, cuando se observe la presencia de la plaga en campo.

PERIODO DE REINGRESO

No entre a las zonas tratadas hasta después de 48 horas de realizada la aplicación.

COMPATIBILIDAD

RAMBLA 5% EC es compatible con la mayoría de plaguicidas de uso común, exceptuando los de marcada reacción alcalina como el azufre y otros cúpricos. Se recomienda regar el campo de cultivo antes de la aplicación del producto.

FITOTOXICIDAD

RAMBLA 5% EC no es fitotóxico a las dosis y usos recomendados en esta etiqueta.

RESPONSABILIDAD CIVIL

El titular de registro garantiza que las características físico-químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones aquí dadas.

15 cm