

HOMAI®W.P.

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

FUNGICIDA AGRICOLA

Polvo Mojable (WP)

COMPOSICION :

Thiophanate methyl	500 g/kg
Thiram	300 g/kg
Aditivos	c.s.p. 1 kg

Reg. N° 061-96-AG-SENASA

TITULAR DEL REGISTRO, IMPORTADO Y

DISTRIBUIDO POR:

BASF Peruana S.A.

Av. Oscar R. Benavides 5915, Callao 1. Casilla

3911, Lima 100.

Telf.: (01) 513 2500

Fax : (01) 513 2519



FORMULADO POR:

Nippon Soda Co.Ltd.

2-1, 2 Chome, Ohtemachi,
Chiyoda KU, Tokio 100 – 8165
Tokio - Japón

 **NIPPON SODA CO.,LTD.**

Contenido Neto: 100 g.

Nº de Lote:

Fecha de Formulación:

Fecha de Vencimiento:

NO CORROSIVO NO INFLAMABLE NO EXPLOSIVO

**LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO**

LEA LA ETIQUETA Y LA HOJA INFORMATIVA
ANTES DE USAR EL PRODUCTO
MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL
ALCANCE DE LOS NIÑOS

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.
- Usar solamente el producto que viene en envases originales.
- Conserve el producto sobrante en su envase original, bien cerrado.

PRIMEROS AUXILIOS

Grupo Químico: Benzimidazole +

Dithiocarbamatos

- En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente o lleve el paciente al médico y muéstrele copia de esta etiqueta y la Hoja Informativa adjunta

TELEFONO PARA EMERGENCIAS
TOXICOLÓGICAS

CICOTOX: 0800-1-3040 (línea gratuita)

BASF Peruana SA: 513 2505

ESSALUD en Línea (opción 4) 0801-10200

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

- **Homai®WP** actúa de forma preventiva contra hongos que causan pudriciones durante la germinación, brotamiento y estado de plántulas en los cultivos citados en el cuadro de usos. **Homai®WP** inhibe los procesos de mitosis y división celular e interfiere con diversos procesos enzimáticos involucrados en la respiración, inhibiendo la germinación de esporas y el crecimiento y desarrollo de micelio. **Homai®WP** tiene una acción sistémica y de contacto. La formulación de **Homai®WP** minimiza el desarrollo de resistencia.
- El uso de **Homai®WP** es una medida preventiva para el control de las enfermedades mediante el tratamiento de semillas o plántulas de diversos cultivos.
- Para el tratamiento de semillas emplear **Homai®WP** sin ninguna preparación a la dosis que se indican. En el caso de tratamiento de plántulas: llenar el cilindro hasta la mitad, agregar la dosis recomendada y esperar que el producto se mezcle con el agua para después agitar y completar con agua.

FRECUENCIA Y EPOCA DE APLICACIÓN:

- Aplicar a las semillas o plántulas al inicio de campaña.

RESPONSABILIDAD CIVIL:

"El titular del Registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas".

