

LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO  
MANTENGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

# HOMAI® W.P.

FUNGICIDA AGRICOLA

Polvo Mojable (WP)

**COMPOSICION :**

Thiophanate methyl ..... 500 g/Kg  
Thiram ..... 300 g/Kg  
Aditivos ..... c.s.p. 1 Kg

**PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN**

- Consérvese el producto en envases originales, herméticamente cerrados. El producto debe ser transportado debidamente embalado y nunca con alimentos, bebidas, medicinas de uso humano y/o animal, ni forrajes. Debe ser almacenado en lugares con llave, bajo techo y manipularse con cuidado.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Durante la manipulación y aplicación hacer uso de guantes. En caso de salpicaduras a los ojos, lavarlos bien con agua. Ver primeros auxilios. Hacer uso de guantes protectores. Si le cae producto en la piel, lavarse bien. Si le cae en la ropa, cambiarse y lavarla inmediatamente.
- Durante la aplicación, como con todos los agroquímicos, evitar el contacto directo con el producto.
- Después de la aplicación, en caso de haber estado en contacto con el producto, así como después de cada aplicación se recomienda lavarse bien, bañarse y cambiarse de ropa y lavarla antes de volver a usarla.
- Usar solamente el producto que viene en envases originales.
- Conserve el producto sobrante en su envase original, bien cerrado.

**PRIMEROS AUXILIOS**

**Grupo Químico: Benzimidazole + Dithiocarbamatos**

- En caso de ingestión accidental no inducir el vómito, no dé a beber ningún tipo de líquido a una persona que esta inconsciente. Consultar al médico.
- Inhalación: Retire el paciente a un lugar fresco, seco y ventilado, manténgalo en reposo y pida ayuda médica.
- Contacto con la piel: Quitar la ropa contaminada con el producto y lavar la piel con abundante agua y jabón. Colocar ropa limpia. Consultar al médico.
- Contacto con los ojos: Mantenga los párpados abiertos, lavar con flujo continuo de abundante agua limpia durante 15 minutos. Consultar al médico.
- En caso de intoxicación, lleve al paciente al médico y dele copia de esta etiqueta.
- No existe antídoto específico. Tratamiento sintomático.

**TELEFONO PARA EMERGENCIAS TOXICOLÓGICAS**

CICOTOX: 0800-1-3040 (línea gratuita)

BASF Peruana SA: 513 2505

**ESSALUD en Línea (opción 4) 0801-10200**

**MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACIOS**

Después de usar el contenido destruya este envase y deposítelo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin.

**MEDIDAS PARA LA PROTECCION Y CONSERVACION DEL AMBIENTE:**

- No lave los equipos de aplicación en lagos, ríos, acequias, arroyos o estanques. Aplique el producto como se indica en la etiqueta. No reutilice los envases destrúyalos.
- No deseché las aguas de lavado, residuos y empaques vacíos en o cerca de fuentes de agua, ríos o lagos.

**INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO**

Homai®WP actúa de forma preventiva contra hongos que causan pudriciones durante la germinación, brotamiento y estado de plántulas en los cultivos citados en el cuadro de usos. Homai®WP inhibe los procesos de mitosis y división celular e interfiere con diversos procesos enzimáticos involucrados en la respiración, inhibiendo la germinación de esporas y el crecimiento y desarrollo de micelio. Homai®WP tiene una acción sistémica y de contacto. La formulación de Homai®WP minimiza el desarrollo de resistencia. El uso de Homai®WP es una medida preventiva para el control de las enfermedades mediante el tratamiento de semillas o plántulas de diversos cultivos.

Para el tratamiento de semillas emplear Homai®WP sin ninguna preparación a la dosis que se indican. En el caso de tratamiento de plántulas: llenar el cilindro hasta la mitad, agregar la dosis recomendada y esperar que el producto se mezcle con el agua para después agitar y completar con agua.

**CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO**

**CUADRO DE USOS**

Cultivo	Enfermedad	Nombre técnico	Dosis	PC* (Días)	LMR** (ppm)
Alcachofa	Chupadera fungosa	<i>Rhizoctonia solani</i>	0.4 kg/200L agua	na	0.10 <sup>1</sup> 0.10 <sup>2</sup>
Algodón	Chupadera fungosa	<i>Rhizoctonia solani</i>	200g/100 kg de semilla (zona Piura). 300 - 500 g/100 kg de semilla (Costa Central)	na	0.10 <sup>1</sup> 0.10 <sup>2</sup>
Arroz	Pyricularia	<i>Pyricularia spp.</i>	200g/100 kg de semilla	na	0.01 <sup>1</sup> 0.10 <sup>2</sup>
Cebada	Helminthosporiosis	<i>Helminthosporium spp</i>	200g/100 kg de semilla	na	0.30 <sup>1</sup> 0.10 <sup>2</sup>
Espárrago	Marchitez	<i>Fusarium oxysporum</i>	200g/ 200L agua	na	0.10 <sup>1</sup> 0.10 <sup>2</sup>
	Chupadera fungosa	<i>Rhizoctonia solani</i>			
Maiz	Helminthosporiosis	<i>Helminthosporium spp</i>	200g/100 kg de semilla	na	0.01 <sup>1</sup> 0.10 <sup>2</sup>
Papa	Hielo (Rancha)	<i>Phytophthora infestans</i>	200g/500 kg de semilla 1 kg/200 L de agua.	na	0.10 <sup>1</sup> 0.10 <sup>2</sup>
	Chupadera	<i>Fusarium spp.</i>	Aplique al fondo del surco a la siembra antes de tapar la papa		
Pimiento	Chupadera fungosa	<i>Rhizoctonia solani</i>	0.3 - 0.4 Kg/200L 0.6 - 0.8 Kg/ha Aplique al cuello de plántulas o para desinfección de plántulas	na	0.10 <sup>1</sup> 0.10 <sup>2</sup>

\*PC Período de carencia 1 thiophanathe methyl

\*\*LMR Límite máximo de residuos 2 thiram

Na: No aplica debido a que Homai®WP se aplica al momento de la siembra y por el tiempo transcurrido a la cosecha no se registran residuos en los cultivos a la cosecha

**FRECUENCIA Y EPOCA DE APLICACIÓN:** Aplicar a las semillas o plántulas al inicio de campaña.

**PERIODO DE REINGRESO:** Reingrese a los campos de cultivo después de 24 horas de realizada

**COMPATIBILIDAD:** Homai®WP se puede combinar con insecticidas, destinados a proteger la semilla y/o

plántulas de plagas presentes en el suelo durante las primeras etapas de desarrollo de las plantas.

**FITOTOXICIDAD:** No se ha reportado fitotoxicidad a las dosis que se indica en la etiqueta.

**RESPONSABILIDAD CIVIL:**

"El titular del Registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas".



The Chemical Company

TITULAR DEL REGISTRO, IMPORTADO Y DISTRIBUIDO POR:  
BASF Peruana S.A.  
Av. Oscar R. Benavides 5915, Callao 1. Casilao 3911, Lima 100.  
Telf.: (01) 513 2500  
Fax : (01) 513 2517  
FORMULADO POR:  
Nippon Soda Co.Ltd.  
2-1, 2 Chome, Ohlemachi, Chiyoda KU, Tokio  
100 - 8165 Tokio - Japón  
Teléfono.: + 81-3-3245-6054  
Fax : + 81-3-3245-6238

NIPPON SODA

Reg. No 061-96-AG-SENASA

Contenido Neto 20 Kg  
Nº de Lote  
Fecha de Formulación  
Fecha de Vencimiento

® = Marca Registrada NIPPON SODA CO LTDA

NO CORROSIVO - NO INFLAMABLE - NO EXPLOSIVO



LIGERAMENTE PELIGROSO  
CUIDADO

