

HOMAI®W.P.

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

FUNGICIDA AGRÍCOLA

POLVO MOJABLE (WP)

COMPOSICIÓN :

Thiophanate methyl 500 g/kg
Thiram 300 g/kg
Aditivos c.s.p. 1 kg

Reg. N° 061-96-AG-SENASA

TITULAR DEL REGISTRO, IMPORTADO Y

DISTRIBUIDO POR:

BASF Peruana S.A.

Av. Oscar R. Benavides 5915, Callao 1. Casilla
3911, Lima 100.

Tel.: (01) 513 2500

Fax : (01) 513 2519



We create chemistry



NIPPON SODA CO., LTD.

FORMULADO POR:

Nippon Soda Co. Ltd.

2-1, 2 Chome, Ohtemachi,
Chiyoda KU, Tokio 100 - 8165
Tokio - Japón

Contenido Neto: 1 kg

N° de Lote:

Fecha de Formulación:

Fecha de Vencimiento:

NO CORROSIVO NO INFLAMABLE NO EXPLOSIVO

© Marca Registrada NIPPON SODA CO.LTDA

**LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO**



**LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO
MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE
DE LOS NIÑOS**

**PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y
APLICACIÓN**

- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.
- Usar solamente el producto que viene en envases originales.
- Conserve el producto sobrante en su envase original, bien cerrado.

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

- **Homal®WP** actúa de forma preventiva contra hongos que causan pudriciones durante la germinación, brotamiento y estado de plántulas en los cultivos citados en el cuadro de usos. **Homal®WP** inhibe los procesos de mitosis y división celular e interfiere con diversos procesos enzimáticos involucrados en la respiración, inhibiendo la germinación de esporas y el crecimiento y desarrollo de micelio. **Homal®WP** tiene una acción sistémica y de contacto. La formulación de **Homal®WP** minimiza el desarrollo de resistencia.
- El uso de **Homal®WP** es una medida preventiva para el control de las enfermedades mediante el tratamiento de semillas o plántulas de diversos cultivos.
- Para el tratamiento de semillas emplear **Homal®WP** a la dosis que se indica en el cuadro de usos. En el caso de tratamiento de plántulas: llenar el cilindro hasta la mitad, agregar la dosis recomendada y esperar que el producto se mezcle con el agua para después agitar y completar con agua.

CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO

CUADRO DE USOS				
Cultivo	Enfermedad	Dosis		
	Nombre común	Nombre técnico	PC* (días)	LMR** (ppm)
Alcachofa	Chupadera fungosa	<i>Rhizoctonia solani</i>	na	0.10 ¹ 0.10 ²
Algodón	Chupadera fungosa	<i>Rhizoctonia solani</i>	na	0.10 ¹ 0.10 ²
Arroz	Pyricularia	<i>Pyricularia spp.</i>	na	0.01 ¹ 0.10 ²
Cebada	Helminthosporiosis	<i>Helminthosporium spp</i>	na	0.30 ¹ 0.10 ²
Espárrago	Marchitez	<i>Fusarium oxysporum</i>	na	0.10 ¹ 0.10 ²
Maíz	Chupadera fungosa	<i>Rhizoctonia solani</i>	na	0.01 ¹ 0.10 ²
Papa	Helminthosporiosis	<i>Helminthosporium spp</i>	na	0.10 ¹ 0.10 ²
Pimiento	Hielo (Rancha)	<i>Phytophthora infestans</i>	na	0.10 ¹ 0.10 ²
	Chupadera	<i>Fusarium spp.</i>		
	Chupadera fungosa	<i>Rhizoctonia solani</i>	na	0.10 ¹ 0.10 ²

*PC Período de carencia
**LMR Límite máximo de residuos
*1MR Límite máximo de residuos
2 thiram

na: No aplica debido a que **Homal®WP** se aplica al momento de la siembra y por el tiempo transcurrido a la cosecha no se registran residuos en los cultivos a la cosecha
Los períodos de carencia indicados en la etiqueta son para las condiciones locales, para fines de exportación el usuario debe atenerse a las tolerancias establecidas en los países de destino.

FRECUENCIA Y EPOCA DE APLICACIÓN: Aplicar a las semillas o plántulas al inicio de campaña.

- En papa: Aplicar al fondo del surco a la siembra antes de tapar la papa.
- En pimiento: Aplicar al cuello de plántulas o para desinfección de plántulas

PERIODO DE REINGRESO: Reingrese a los campos de cultivo después de 24 horas de realizada

COMPATIBILIDAD: **Homal®WP** se puede combinar con insecticidas, destinados a proteger la semilla y/o plántulas de plagas presentes en el suelo durante las primeras etapas de desarrollo de las plantas.

FITOTOXICIDAD: No se ha reportado fitotoxicidad a las dosis que se indica en la etiqueta.

RESPONSABILIDAD CIVIL:

"El titular del Registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas".

LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO
MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE
DE LOS NIÑOS

PRIMEROS AUXILIOS

Grupo Químico: Benzimidazole + Dithiocarbamatos

- En caso de ingestión accidental no inducir el vómito, no dé a beber ningún tipo de líquido a una persona que esta inconsciente. Consultar al médico.
- Inhalación: Retire el paciente a un lugar fresco, seco y ventilado, manténgalo en reposo y pida ayuda médica.
- Contacto con la piel: Quitar la ropa contaminada con el producto y lavar la piel con abundante agua y jabón. Colocar ropa limpia. Consultar al médico. Contacto con los ojos: Mantenga los párpados abiertos, lavar con flujo continuo de abundante agua limpia durante 15 minutos. Consultar al médico.
- En caso de intoxicación, lleve al paciente al médico y dele copia de esta etiqueta.
- No existe antídoto específico. Tratamiento sintomático.

TELEFONOS DE EMERGENCIA

SAMU: 106
CISPROQUIM (línea gratuita): 0 800 50 847
BASF Peruana S.A.: 513 2505

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

- Después de usar el contenido destruya este envase y deposítelo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin.

MEDIDAS PARA LA PROTECCION Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE:

- No lave los equipos de aplicación en lagos, ríos, acequias, arroyos o estanques. Aplique el producto como se indica en la etiqueta. No reutilice los envases destrúyalos.
- No deseche las aguas de lavado, residuos y empaques vacíos en o cerca de fuentes de agua, ríos o lagos.
- En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en el sitio destinado por las autoridades para tal fin.

