

15.0 cm

30 cm

LEA CUIDADOSAMENTE ESTA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO
"MANTÉNGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN:

- El producto es nocivo por ingestión.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- No almacenar en casa-habitación, ni cerca de alimentos, medicinas, ni forraje. Almacenar en un lugar fresco ventilado bajo sombra.
- No transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas, ni forrajes.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación y para ingresar al área tratada durante las primeras 24 horas.
- No permitir el ingreso de niños, personas en general ni animales domésticos al área tratada.
- No permitir personas embarazadas cerca al área tratada. Posible teratógeno, puede causar daño al feto.
- Después de usar el producto, cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Ningún envase que haya contenido este producto deberá ser utilizado para almacenar o transportar agua ni alimento de consumo.

PRIMEROS AUXILIOS:

- Grupo químico: Benzimidazol
- En caso de intoxicación, retirar a la persona de la zona contaminada, llame al médico inmediatamente, o lleve al paciente al médico y muéstrele la etiqueta.
- En caso de ingestión: no provocar vómito, pero no evitarlo si se produce en forma espontánea. No dar nada por la boca a una persona inconsciente, obtener asistencia médica o trasladar al paciente a un centro médico.
- En caso de contacto con la piel, retirar la ropa contaminada, lavar el área afectada con abundante agua y jabón, retirar al afectado de la zona tratada. Consultar al médico.
- En caso de contacto con los ojos: enjuagarlos con agua limpia y fresca durante 15 minutos, si la irritación persistiera consultar al médico, no aplicar nada a menos que lo recomiende el médico.
- En caso de inhalación retirar al afectado de la zona tratada, a un lugar ventilado, asistir con respiración artificial si fuera necesario. Consulte al médico.

TELÉFONOS DE EMERGENCIA:

CICOTOX: 0800 - 1 - 3040

BIOAGROCORP TRADING SAC: 478-2002

- No existe antídoto específico, dar tratamiento sintomático.

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS:

- Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo triturándolo o perforándolo y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE:

- Peligroso para organismos acuáticos.
- No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 05 metros.
- Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- El producto no debe aplicarse en zonas con napas freáticas superficiales o en suelos altamente permeables.
- En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en el sitio destinado por las autoridades para tal fin.
- Aplicar temprano en las mañanas o muy en las tardes. Evitar la deriva por el viento.



FUNGIZIM

500 SC

FUNGICIDA AGRÍCOLA

SUSPENSIÓN CONCENTRADA - SC

COMPOSICIÓN:

Carbendazim 500 g/L
Aditivos c.s.p 1 L

Reg. PQUA N° 795 - SENASA

Titular del Registro: BIOAGROCORP TRADING S.A.C.

Importado y distribuido por:
BIOAGROCORP TRADING S.A.C.



Calle Los Flamencos N° 121 Interior 6 Santa Anita

Teléfono: 478-2002 / Fax: 362-0014

N° de Lote:

F. de Form.:

F. de Venc.:

Contenido neto: 200 L

Formulado por:

HANGZHOU CHANGHE AGRICULTURAL CHEMICAL CO., LTD

64 Riverside Wharf, Changhe Town, Hangzhou - Zhejiang

CHINA



NO CORROSIVO

INFLAMABLE

NO EXPLOSIVO

LIGERAMENTE PELIGROSO CUIDADO



INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO:

FUNGIZIM 500 SC es un fungicida sistémico de amplio espectro con acción protectora y curativa.

FUNGIZIM 500 SC impide el desarrollo de las hifas, la formación de apresorios y el crecimiento del micelio. Detiene el desarrollo del tubo germinativo provocando irregularidades en la división celular y dando lugar a células anormales que provocan la muerte del hongo.

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

CUADRO DE USOS:

CULTIVO	PLAGA		DOSIS		P.C. (días)	L.M.R. (ppm)
	Nombre Común	Nombre Técnico	L/ 200 L	L/ha		
Mandarina	Moho gris	<i>Botrytis cinerea</i>	0.3	1.5	14	0.7
Tomate	Moho gris	<i>Botrytis cinerea</i>	0.3 - 0.5	0.6 - 1.0	7	0.5

P.C.: Periodo de carencia

L.M.R.: Límites máximos de residuos

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN: Aplicar **FUNGIZIM 500 SC** al observarse los primeros síntomas de la enfermedad. Se recomienda hasta un máximo de 2 aplicaciones por cultivo/campaña/año

PERIODO DE REINGRESO: No reingresar al campo tratado antes de 24 horas de realizada la aplicación.

FITOTOXICIDAD: **FUNGIZIM 500 SC** no es fitotóxico para los cultivos recomendados.

COMPATIBILIDAD: **FUNGIZIM 500 SC** es compatible con la mayoría de pesticidas de uso frecuente excepto con aquellos de reacción fuertemente alcalina, ácida u oxidante.

RESPONSABILIDAD CIVIL: El Titular del Registro garantiza que las características físico-químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.



2.17 cm