

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

HERBICIDA AGRÍCOLA

SUSPENSIÓN CONCENTRADA (SC)

NO EXPLOSIVO



LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO

- Peligroso para organismos acuáticos.
- No contaminar lagos, ríos, estanques o arroyos con los desechos y envases vacíos.

Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 10 metros.

- En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en el sitio destinado por las autoridades locales para este fin.



CULTIVO	MALEZAS	DOSIS		PC (dias)	LM (ppm)
		(L/200 L)	(L/ha)		
ESPÁRRAGO	Capulí cimarrón (<i>Nicandra physalodes</i>) Verdolago (<i>Portulaca oleracea</i>) Pata de gallina (<i>Equisetum indica</i>) Lechera (<i>Euphorbia heterophylla</i>) Yuyo (<i>Amaranthus</i> <i>viridis</i>), Amor seco (<i>Bidens pilosa</i>)	0.08-0.20	0.15-0.20	14	0.
	Chamico (<i>Datura stramonium</i>), Lechera (<i>Euphorbia hirta</i>) Lengua de vaca (<i>Rumex crispus</i>) Trebol (<i>Trifolium pratense</i>) Yuyo (<i>Amaranthus hybridus</i>)	-	0.30-0.40	60	0.
	Capulí cimarrón (<i>Nicandra physalodes</i>) Verdolago (<i>Portulaca oleracea</i>) Hierba gallinazo (<i>Chenopodium murale</i>) Cola de Añón (<i>Heliotropium curassavicum</i>) Pata de gallina (<i>Equisetum indica</i>) Rabo de zorro (<i>Sesuvia portulacastrum</i>)	-	0.20-0.30	60	0.

El Titular del registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.



contracara

Dimensiones: 150 mm x 140 mm por cara
Esta etiqueta requiere Hoja Informativa