

LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO
MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

MANZEB

FUNGICIDA AGRÍCOLA

POLVO MOJABLE – WP

COMPOSICIÓN QUÍMICA:

Mancozeb80 % p/p
Ingrediente inertes20 % p/p

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACION

- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- Usar ropa protectora durante el manipuleo y aplicación, y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas. Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- No comer, no beber ni fumar durante la aplicación. No almacenar ni transportar junto con alimentos, forrajes, bebidas o medicinas.
- Este producto causa irritación moderada a los ojos.

PRIMEROS AUXILIOS

- Grupo Químico: Ditiocarbamatos.
- En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente y muéstrele la etiqueta. **Teléfonos de Emergencia: Central de Urgencias y Emergencias de EsSalud 117 (línea gratuita), CICOTOX 0800-13040 (línea gratuita), FARMEX S.A. 630-6400.**
- **Intoxicación inhalatoria:** llevar a la persona intoxicada a un ambiente con aire fresco y dejar reposar hasta conseguir ayuda médica.
- **Intoxicación por ingestión:** enjuagar la boca e inducir al vómito solo si el paciente está consciente. Reposar y llamar a un médico.
- **Intoxicación dermal:** remover las ropas contaminadas con el producto. Enjuagar la zona afectada con abundante agua y jabón.
- **Intoxicación ocular:** enjuagar los ojos con abundante agua (remover lentes de contacto si es posible) y luego acudir a un médico.

NOTA AL MÉDICO

- **Exposición inhalatoria:** Se recomienda el monitoreo de la respiración del paciente. Si continúa la tos o la dificultad respiratoria se debe evaluar una irritación al tracto respiratorio, bronquitis o neumonía. Se administra oxígeno y ventilación asistida si se requiere.
- **Exposición oral:** Administración de carbón activado (240 mL de agua para 30 g de carbón). Dosis: 25 a 100 g adultos/adolescente, 25 a 50 g en niños (1-12 años) y 1 g/Kg (<1 año). Considerar un lavado gástrico y la aplicación de fluidos intravenosos.
- No existe antídoto específico. Se recomienda un tratamiento sintomático.

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

Después de usar el contenido del envase, destruirlo, introducirlo dentro de una bolsa plástica y depositarlo en sitios destinados por la autoridad para este propósito. No reutilizar los envases ni tampoco enterrarlos.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE

- Restringir el uso a zonas de cultivo; no aplicar cerca de vegetación ribereña, áreas protegidas, hábitat silvestre, canales de regadío o en zonas cercanas a piscigranjas.
- Este producto es moderadamente tóxico para peces y crustáceos, y extremadamente tóxico para algas.
- No aplicar cerca de fuentes de agua donde habitan estos organismos: lagos, lagunas, puquiales, humedales, manglares, riberas y playas.

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

MANZEB es un fungicida protectante y de acción superficial, que actúa por contacto sobre las esporas de los hongos.

El caldo de aplicación se prepara llenando el tanque de preparación con agua hasta la mitad. Se agrega luego la dosis de **MANZEB** y se completa con agua hasta llenar el depósito, removiendo hasta lograr una completa suspensión del producto.

“CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO”

RECOMENDACIONES EN APLICACIÓN FOLIAR

Cultivo	Enfermedad	Nombre Científico	Dosis		P.C. (días)	L.M.R. (ppm)
			%	kg/ha o kg/cil		
Cebolla	Mancha púrpura	<i>Stemphylium vesicarium</i>	0.25-0.5	---	28	0.5
Espárrago	Cercosporiosis	<i>Cercospora asparagi</i>	1.25-1.5	2.5 - 3.0 kg/ha	14	0.05
Mandarina	Pudrición gris	<i>Botrytis cinerea</i>	0.5	1 kg/cil	15	5
Palto	Moho gris	<i>Botrytis cinerea</i>	0.375-0.5	0.75 - 1.0 kg/cil	21	0.05
Papa	Hielo o racha	<i>Phytophthora infestans</i>	0.25-0.3	0.5 - 0.6 kg/cil	7	0.05
Tomate	Hielo o racha Mancha negra	<i>Phytophthora infestans</i> <i>Alternaria solani</i>	0.25-0.3	0.5 - 0.6 kg/cil	7 7	3 3

RECOMENDACIONES PARA IMPREGNACIÓN DE SEMILLAS

Cultivo	Enfermedad	Nombres Científicos	Dosis	LMR (ppm)
Arroz	Quemado Epiflora fungosa Manchado del grano	<i>Pyricularia oryzae</i> , <i>Bipolaris oryzae</i> <i>Alternaria</i> sp. <i>Nigrospora</i> sp., <i>Curvularia</i> sp.	2 g / kg de semilla	0.05

P.C. = Período de carencia en días. L.M.R. = Límite máximo de residuos en partes por millón.

FRECUENCIA Y EPOCA DE APLICACION

Por ser preventivo las aplicaciones se realizan cuando las condiciones climáticas y estado fenológico de la planta son favorables para el desarrollo de la enfermedad.

PERÍODO DE REINGRESO. No reingresar sin protección a un campo aplicado hasta por lo menos 24 horas luego de la aplicación.

COMPATIBILIDAD. Compatible con la mayoría de insecticidas, fungicidas y acaricidas, menos con productos de reacción alcalina.

FITOTOXICIDAD

MANZEB no ha mostrado causar fitotoxicidad en los cultivos a las dosis recomendadas.

RESPONSABILIDAD CIVIL

El Titular del Registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.

Reg. N° 305-96-AG-SENASA

Contenido neto: 25 kilogramos

Titular del Registro: **FARMEX S.A.**



Importado y distribuido por:

FARMEX S.A.

Calle Dean Valdivia 148, Piso 7

San Isidro, Lima 27 - PERU.

Teléfono: (01) 630-6400, Fax: (01) 630-6410

Lote N°:

F. Fab.:

F. Venc.:

Formulado por:

SABERO ORGANICS GUJARAT LTD.

A-302, Phoenix House, 3rd Floor, 462

Senapati Bapat Marg, Worli (E)

Mumbai 400 013 - India

NO CORROSIVO

NO INFLAMABLE

NO EXPLOSIVO

**LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO**

