

11.0 centimeters

1.65 centimeters

27.50 centimeters

0.5 centimeters

0.35 centimeters

0.35 centimeters

0.5 centimeters

"LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO"
"MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

-El producto es nocivo por ingestión y por inhalación. -No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación. Durante la manipulación y aplicación, y para ingresar al área tratada de acuerdo al período de reentrada (reingreso), use camisa de manga larga, pantalón largo, botas, visor, tapabocas o máscara y guantes. Después de usar el producto, cámbiese, lave la ropa contaminada por separado y báñese con abundante agua y jabón.
-Almacenar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado, alejado de alimentos y medicinas para uso humano y veterinario, bajo condiciones que garanticen su conservación.
-Ningún envase que haya contenido plaguicidas deberá utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo. -No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes. -No almacenar en casas de habitación. -El uso inadecuado de este producto causa daños a la salud y al ambiente.

INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS

-Grupo químico: avermectinas.
-En caso de intoxicación, llame al médico inmediatamente, o lleve al paciente al médico y muéstrela la etiqueta. -En caso de contacto con los ojos, enjuáguelos con abundante agua durante quince (15) minutos. -En caso de contacto con la piel, retirar la ropa contaminada y lavar la zona expuesta con abundante agua y jabón. -En caso de inhalación, trasladar al paciente hacia el aire fresco, mantenerlo en reposo y proporcionar ayuda respiratoria si fuera necesario. -Antídoto: No hay antídoto específico. Tratamiento sintomático.
-Teléfonos de emergencia: SAMU: 106, FARMEX S.A.: (01) 630-6400, CISPROQUIM: 080-050-847.
CONDICIONES DE MANEJO Y DE DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS
-Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe reutilizarse. Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo triturándolo o perforándolo. Entregue o deposite el envase en el lugar de destino dispuesto por la autoridad competente, para su gestión.
-Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.
-Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE

-Peligroso para abejas u otros artrópodos benéficos. No aplicar en época de floración.
-Peligroso para organismos acuáticos. No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto, desechos o envases vacíos. -Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 5 metros. -Peligroso para los animales domésticos, la fauna y la flora silvestre. No permitir animales en el área tratada. -El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva. -En caso de derrame recoger el producto y gestionarlo según lo establecido por las autoridades competentes para este fin.

Larvistop®

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA INSECTICIDA AGRÍCOLA

CONCENTRADO EMULSIONABLE (EC)

COMPOSICIÓN:

Emamectin benzoato.....19 g/L
Aditivos.....c.s.p... 1.0 L

Reg. PQUA N° 811 - SENASA

Titular del Registro: FARMEX S.A.

Formulado y distribuido por:



Calles Dean Valdivia N° 148 Piso 7
San Isidro, Lima 27 - PERÚ
Teléfono: (01) 630-6400
www.farmex.com.pe

CONTENIDO NETO: 500 mL

N° de Lote:

Fecha de formulación:

Fecha de vencimiento:

"VER PARTE

SUPERIOR"

NO CORROSIVO NO INFLAMABLE NO EXPLOSIVO

© Marca registrada de Farmex S.A.

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

LARVISTOP® es un insecticida para el control de lepidópteros que tiene acción estomacal y por contacto. También tiene movimiento translinar que atraviesa los tejidos de la hoja. **LARVISTOP®** paraliza los movimientos de la plaga bloqueando las señales nerviosas de las larvas, luego éstas dejan de alimentarse, se paralizan irreversiblemente y finalmente mueren. **LARVISTOP®** se aplica en pulverización empleando equipos terrestres tanto manuales como motorizados. Agitar fuertemente el envase antes de usarlo. Llene el cilindro o tanque de aplicación con agua limpia hasta la mitad y luego agregue el producto revolviendo constantemente. Complete luego hasta el volumen deseado.

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

CULTIVO	PLAGA		DOSIS		PC (días)	LMR (ppm)
	NOMBRE COMÚN	NOMBRE CIENTÍFICO	(mL/cil)	(L/ha)		
ESPÁRRAGO	Gusano defoliador	<i>Coptarsia incommoda</i>	100	0.2	3	0.5
MAÍZ	Gusano cogollero	<i>Spodoptera frugiperda</i>	100	0.2	3	0.01

PC: Período de carencia. LMR: Límite máximo de residuos en partes por millón.

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN: No realizar más de 2 aplicaciones por campaña. El intervalo de aplicación es de 14 días. La aplicación se debe realizar cuando se observen los primeros estadios larvales de la plaga.

PERÍODO DE REINGRESO: No reingresar sin protección a un campo aplicado hasta 24 horas después de la aplicación.

COMPATIBILIDAD: Es compatible con la mayoría de plaguicidas comúnmente usados a excepción de los de reacción muy alcalina (pH > 9). Antes de hacer la mezcla con otros plaguicidas se debe probar la compatibilidad entre los productos mezclándolos en su debida proporción en un envase pequeño.

FITOTOXICIDAD: **LARVISTOP®** no ha mostrado síntomas de fitotoxicidad luego de ser aplicado a las dosis y en los cultivos recomendados. La aplicación de dosis superiores a las señaladas en el cuadro de usos, podrían ocasionar fitotoxicidad en el cultivo. Aplicar sólo las dosis señaladas en el cuadro de usos.

RESPONSABILIDAD CIVIL: El titular del registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo a las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular del registro o con el distribuidor del producto.

**LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO**



0.2 centimeters

0.2 centimeters

versión 3