20,3 ± 0,3

1,2 ± 0,2

1,2 ± 0,2

3,5 ± 0,3

0,8

Cuter II

350 SC

Composición Química:

Imidacloprid ..... 350 g/L

Aditivos ..... c.s.p. 1L

Registro PQUA N° - SENASA

Titular del Registro: SILCROP S.A.C.

Contenido Neto: **100 ml**

N° Lote:

F. Form.:

F. Venc.:

NO CORROSIVO

NO INFLAMABLE

NO EXPLOSIVO

silcrop

MODERADAMENTE PELIGROSO DAÑINO

LEA CUIDADOSAMENTE ESTA ETIQUETA Y LA HOJA INFORMATIVA ADJUNTA ANTES DE USAR EL PRODUCTO
"MANTÉNGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- Utilizar ropa protectora durante el manipuleo y aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.
- Después de usar el contenido, enjuague 3 veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación; luego inutilícelo triturándolo o perforándolo y depósitelo en los lugares destinados por las autoridades locales para este fin.
- En caso de presentar síntomas de intoxicación, llame al médico inmediatamente o lleve al paciente al médico y muéstrele esta etiqueta y la **Hoja Informativa Adjunta.**

TELÉFONOS DE EMERGENCIA
CICOTOX 0-800-1-3040
ESSALUD 117
SILCROP 637-4033
CISPROQUIM 0-800-5-0847

Medidas en cm.

Envase: COEX