

**LEA CUIDADOSAMENTE ESTA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO
"MANTÉNGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"**

PRECAUCIONES, MANIPULEO, ALMACENAJE Y TRANSPORTE

Este producto es ligeramente tóxico; tener en cuenta las siguientes medidas de precaución:

- Almacenar en ambientes fríos, secos y bien ventilados. Mantener los envases herméticamente cerrados.
- Mantener el producto fuera del alcance de los niños.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación del producto.
- No almacenar ni transportar junto con animales, alimentos, bebidas, medicinas, y/o forrajes.
- Realice la operación de aplicación siguiendo la dirección del viento.
- Asegurar una adecuada ventilación del área de trabajo.

PRIMEROS AUXILIOS

- **OMEX® SW7** es un producto formulado no tóxico, sin embargo se deben tomar ciertas precauciones durante su manipulación.
- Puede causar irritación en la piel, o dermatitis. En caso de contacto, lavar la piel inmediatamente con abundante agua y jabón. Despojarse de la ropa contaminada. Buscar atención médica si la irritación persiste.
- En caso de contacto con los ojos: enjuagar inmediatamente con abundante agua por 15 minutos manteniendo los párpados abiertos. Buscar atención médica si la irritación o los síntomas persisten.
- Es dañino si es ingerido. Puede causar náuseas y vómitos, irritación al tracto respiratorio y daños al sistema nervioso central. **NO INDUCIR AL VÓMITO.** Si es ingerido buscar atención médica inmediatamente y mostrar la etiqueta.
- Llamar en caso de envenenamiento al centro de control de intoxicaciones o al doctor para un tratamiento aconsejado.

NOTA AL MÉDICO: Tratamiento sintomático

Toxicología

Ligeramente tóxico.

LD₅₀ oral : > 5000 mg/kg de peso corporal

LD₅₀ dermal : > 2000 mg/kg de peso corporal

Antídoto: No existe un antídoto específico.

TELÉFONOS DE EMERGENCIA
CICOTOX: 0-800-1-3040 ó 328 7398
ESSALUD: 0801-10200 ó 411 8000 (opción 4)
CISPROQUIM: 0800-50847

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

- Después de usar el contenido, enjuague tres veces el envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo triturándolo o perforándolo y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.



NOTA AL COMPRADOR

El Titular del Registro garantiza que las características fisicoquímicas del producto contenido en este envase corresponde a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.



NO CORROSIVO

INFLAMABLE

NO EXPLOSIVO

**MANTENGA ALEJADO DE LAS PERSONAS, ANIMALES,
PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y MEDICINALES.**



OMEX[®] SW7

**(Tetraethyl silicate)
Concentrado Soluble (SL)**

Composición Química:

Tetraethyl silicate 700 g/L

(Equivalente a 65 g/L de Silicio)

Aditivos c.s.p. 1 L

PLAGUICIDA BIOLÓGICO DE USO AGRÍCOLA

Registro PBUA N° 283 - SENASA

Titular de Registro: SILVESTRE PERÚ S.A.C.

Calle Arica 242 Miraflores. Lima 18 - Perú.

Tel.: (01) 617-3300 Fax: (01) 617-3312

Correo electrónico: sec@silvestre.com.pe

Formulado por: OMEX AGRIFLUIDS LTD

Estuary Road King's. Lynn, Norfolk

Pe30 2HH England.

Importado,

Envasado y

Distribuido por: SILVESTRE PERÚ S.A.C.

Contenido Neto: **1L**

F. de Form:

N° Lote:

F. de Venc:



INDICATIVOS DE USO

OMEX® SW7 es un formulado estable constituido por silicatos (Tetraethyl silicate). **OMEX® SW7** contribuye con las propiedades mecánicas de la pared celular (el silicio forma complejos con el calcio), con lo cual se reduce la incidencia de plagas y enfermedades. Asimismo, forma complejos con polifenoles reforzando la pared celular.

OMEX® SW7 debe aplicarse en suelo húmedo, caso contrario se debe regar inmediatamente después de la aplicación. Para optimizar los resultados, asegurar la completa cobertura de la planta en el momento de la aplicación.

SISTEMA DE PREPARACIÓN Y APLICACIÓN

- Disolver la cantidad requerida de **OMEX® SW7** en poco volumen de agua y luego, añadir al tanque mezclando uniformemente.
- Agitar constantemente la mezcla.

CUADRO DE USOS

CULTIVO	PLAGA		DOSIS ml/200L	PC (días)	LMR (ppm)
	NOMBRE COMÚN	NOMBRE CIENTÍFICO			
BANANO	Trips de la mancha roja	<i>Chaetanaphothrips signipennis</i>	300	n.t.	n.t.
ESPÁRRAGO	Trips	<i>Frankliniella occidentalis</i>	300	n.t.	n.t.
PIMIENTO	Oidium	<i>Leveillula taurica</i>	300	n.t.	n.t.
	Mosca blanca	<i>Bemisia tabaci</i>			
MANGO	Oidiosis	<i>Oidium mangiferae</i>	300	n.t.	n.t.
	Oidium	<i>Erysiphe necator</i>	300	n.t.	n.t.
VID	Araña roja	<i>Tetranychus urticae</i>	300	n.t.	n.t.
	Mosca blanca (anida de los cítricos)	<i>Aleyrothrix floccoxus</i>	300	n.t.	n.t.
QUINUA	Mildiu	<i>Peronospora farinosa</i>	300	n.t.	n.t.
ZAPALLO	Mosca blanca	<i>Bemisia tabaci</i>	300	n.t.	n.t.

LMR: Límite Máximo de Residuos.

n.t.: No tiene

PC: Período de Carencia.

COMPATIBILIDAD

- **OMEX® SW7** es compatible con la mayoría de plaguicidas agrícolas y fertilizantes foliares, excepto con materiales oxidantes. Se recomienda una prueba previa de compatibilidad.

FITOTOXICIDAD

- **OMEX® SW7** no es fitotóxico en los cultivos recomendados, si se emplea a las dosis indicadas.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE

- No contaminar lagos, ríos, estanques o arroyos con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- En caso de derrame, recoger el producto y depositarlo en el sitio destinado por las autoridades locales para este fin.
- **OMEX® SW7** es un nematocida no tóxico para aves, peces y organismos acuáticos. El producto es no tóxico para abejas.

**DESTRUYA ESTE ENVASE INMEDIATAMENTE
DESPUÉS DE USAR EL PRODUCTO.**



**LIGERAMENTE TÓXICO
PRECAUCIÓN**