20.00 cm

0.50 cm

14.00 cm

ZONA DE TROQUELADO

LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO
"MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- Este producto puede ser mortal si se ingiere.
- Causa irritación moderada a los ojos.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo y la aplicación, y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo humano.

PRIMEROS AUXILIOS

- Grupo químico: Fenilpirazoles.
- En caso de ingestión, colocar al paciente en posición tranquila. No inducir al vómito, especialmente si el paciente está inconsciente.
- En caso de inhalación, trasladar al afectado a un lugar con aire fresco y proporcionar ayuda respiratoria si fuera necesario.
- En caso de contacto con la piel, quitarse las prendas contaminadas y lavar el área de la piel afectada con abundate agua y jabón.
- En caso de contacto con los ojos, efectuar una limpieza con bastante agua, aplicada en los ojos en forma de chorro durante 15 minutos, manteniendo los párpados abiertos.
- **Teléfonos de Emergencia: CISPROQUIM: 080-050-847, FARMEX S.A.: (01) 630-6400.**

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

- Después de usar el contenido, enjuague tres veces el envase, vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo triturándolo o perforándolo, y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE

- Peligroso para abejas y otros artrópodos benéficos. Evitar la aplicación en época de floración.
- Peligroso para organismos acuáticos.
- No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de aplicación o sobrantes del producto.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 5 metros.
- Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- Evitar el uso del producto en zonas con napas freáticas superficiales o en suelos altamente permeables.
- En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin.

Célebre®

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

INSECTICIDA AGRÍCOLA

SUSPENSIÓN CONCENTRADA - SC

COMPOSICIÓN:

Fipronil..... 200 g/L
Aditivos.....c.s.p..... 1 L

Reg. PQUA Nº 818-SENASA

Titular del Registro:
FARMEX S.A.

Formulado y distribuido por:

Farmex

FARMEX S.A.
Calle Dean Valdivia Nº 148 Piso 7
San Isidro, Lima 27 - PERÚ
Teléfono: (01) 630-6400
www.farmex.com.pe

CONTENIDO NETO: 20 L

Lote Nº:

F. Form.:

F. Venc.:

NO CORROSIVO **NO INFLAMABLE** **NO EXPLOSIVO**

®Marca registrada de FARMEX S.A.

MODERADAMENTE PELIGROSO
DAÑINO

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

CELEBRE® es un insecticida que actúa por contacto e ingestión, posee una leve actividad sistémica.

Sistema de Preparación y Apliación:
CELEBRE® se aplica en pulverización empleando equipos de aspersión manuales. Para la preparación de la mezcla, llene el cilindro o tanque de aplicación con agua limpia hasta la mitad y luego agregue el producto revolviendo constantemente. Complete luego hasta el volumen deseado. El volumen de aplicación por hectárea es de 400 L (2 cilindros).

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

CULTIVO	PLAGAS		DOSIS (mL/cil)	P.C. (días)	L.M.R. (ppm)
	NOMBRE COMÚN	NOMBRE CIENTÍFICO			
CEBOLLA	Trips	*Thrips tabaci*	200 - 250	21	0.01
ESPÁRRAGO	Prodiplosis	*Prodiplosis longifila*	200	21	0.005
PAPA	Cogojo de los Andes	*Premnotrypes suturicallus*	200	14	0.01

PC: período de carencia. LMR: límite máximo de residuos. PPM: Partes por millón.

FRECUENCIA Y EPOCA DE APLICACIÓN
No realizar más de 2 aplicaciones por campaña/año. El intervalo de aplicación es de 14 días o más.

PERÍODO DE REINGRESO
No reingresar sin protección a un campo aplicado hasta 24 horas después de la aplicaciión.

COMPATIBILIDAD
Es compatible con la mayoría de plaguicidas comúnmente usados a excepción de los de reacción muy alcalina.

FITOTOXICIDAD
CELEBRE® no ha mostrado síntomas de fitotoxicidad luego de ser aplicado a las dosis recomendadas.

RESPONSABILIDAD CIVIL
El Titular del Registro garantiza que las características físicoquímicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.

0.20 cm

2.10 cm

0.20 cm

0.50 cm

0.50 cm