

BENOMAS[®]

50 WP

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

FUNGICIDA AGRÍCOLA

Polvo Mojable (WP)

Composición:

Benomyl 500 g/Kg
Aditivos c.s.p. 1Kg

Reg. PQUA N° 102 - SENASA



Títular de Registro, Importado y Distribuido por:
INSUMOS AGRÍCOLAS PERUANOS S.A.C.
Av. Javier Prado Este N° 6728 Int. 301-A
Urb. Santa Patricia II Etapa,
La Molina, Lima, Perú
Teléfono: (01) 499-7831

Formulado por:
KAJO AGROCHEMICAL CO. LTD.
Qingyang, Jiangyin, Jiangsu
China.

Contenido Neto: **5 Kg**

N° Lote:
F. de Form.:
F. de Venc.:

NO CORROSIVO NO INFLAMABLE NO EXPLOSIVO

LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO

LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO "MANTÉNGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.
- Utilizar mascarilla de protección durante la preparación de la solución.

PRIMEROS AUXILIOS

Grupo Químico: Benzimidazole.

- En caso de intoxicación, llame al médico inmediatamente y muéstrele la etiqueta.
- En caso de contacto con la piel y los ojos, lavarlos con abundante agua fresca y si el contacto fuese con la piel, lavarse con abundante agua y jabón.
- En caso de ingestión accidental, se puede proceder a inducir al vómito.
- No dar de beber nada a un paciente que se encuentre inconsciente.

TELÉFONOS DE EMERGENCIA

CICOTOX: (01) 328-7700
ESSALUD: (01) 411-8000 (opción 4)
INAP: (01) 499-7831

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

- Después de usar el contenido destruya el envase y deposítelo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE

- En caso de derrame, recoger el producto y depositarlo en el lugar destinado para este fin.
- No arrojar envases vacíos o residuos en fuentes de agua.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de aplicación o sobrantes del producto.

- No aplicar a menos de 5 m de fuentes de agua.
- Tóxico para abejas. No aplicar en épocas de floración.

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

BENOMAS 50 WP es un fungicida sistémico que al ser aplicado sobre el follaje es trasladado por la savia hacia toda la planta; y al ser aplicado a las raíces éstas lo absorben y lo trasladan a toda la planta. Para su aplicación, mezclar la dosis recomendada en un poco de agua hasta obtener una suspensión uniforme. Luego vaciar el contenido en un cilindro o tanque de aplicación y completar con agua hasta la capacidad total. Aplicar con mochila mecánica o a motor. Para semillas, sumergirlas por 3 a 5 minutos para una mejor impregnación.

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN

BENOMAS 50 WP puede aplicarse en cualquier etapa fenológica del cultivo. Las aplicaciones foliares y/o en semillas pueden ser preventivas o curativas, cuando se observen los primeros síntomas de la enfermedad o cuando se presentan las condiciones favorables para el desarrollo de dicha enfermedad. Numero máximo de aplicaciones: 3 campaña/año.

PERIODO DE REINGRESO

No deberá entrar a las áreas tratadas durante las 24 primeras horas después de la aplicación.

COMPATIBILIDAD

BENOMAS 50 WP es compatible con la mayoría de plaguicidas de uso común exceptuando los de marcada reacción alcalina.

FITOTOXICIDAD

BENOMAS 50 WP no es fitotóxico a los cultivos indicados en la etiqueta.

RESPONSABILIDAD CIVIL

El Titular del Registro garantiza que las características físico-químicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que, es eficaz para los fines recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

CULTIVO	PLAGAS		DOSIS (Kg/ha)	PC (días)	LMR (ppm)
	NOMBRE COMÚN	NOMBRE CIENTÍFICO			
Espárrago	"Marchitez"	<i>Fusarium oxysporum</i>	2 - 3	7	5
Melocotonero	"Oidium"	<i>Sphaeroteca pannosa</i>	0.5	14	15
Vid	"Moho gris"	<i>Botrytis cinerea</i>	1	15	5

LMR: Límite Máximo de Residuos.

ppm: Partes por Millón

PC: Período de Carencia.



B. TOXICOLÓGICA
L. T. LAVADO



PANTONE 293 C

TEXTO



P. Process Black