

30.0 cm

2.0 cm

“ LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO ”  
“MANTENGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS”

**PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN**

- El producto es peligroso si es inhalado. Evite respirar el polvo durante la preparación de la mezcla de aplicación.
- No comer, beber, ni fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación del producto.
- No almacenar, ni transportar junto con alimentos, medicinas, bebidas, forrajes y/o semillas.
- Después, de usar este producto bññese con abundante agua y jabón, cámbiese y lavar la ropa contaminada.
- Usar equipo de protección, durante la manipulación, mezcla y aplicación del producto y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.
- Realizar la aplicación siguiendo la dirección del viento.
- Conservar este producto en el envase, original, etiquetado y cerrado.
- Almacenar este producto en un ambiente sombreado, seco y ventilado.

**PRIMEROS AUXILIOS.**

- Grupo químico: Clorocotilínicos.
  - En caso de intoxicación, llame al médico inmediatamente, o lleve al paciente al médico y muéstrele la etiqueta.
  - En caso de contacto con los ojos, lavarlos con abundante agua por 15 minutos.
  - En caso de contacto con la piel, quitarle la ropa contaminada y lavarse con abundante agua y jabón.
  - No dar de beber nada a un paciente que se encuentra inconsciente.
- No tiene antídoto específico, su tratamiento es sintomático.

En caso de emergencia llamar a:  
**CICOTOX Telf: 0800-1-3040 (Atención 24 horas)**  
**ESSALUD EN LINEA: 411-8000 Opción 4**  
**FITOCORP SAC: 016522182**

**MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACIOS**

Después de usar el contenido destruya este envase y deposítelo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin.

**MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE**

- Peligroso para las abejas y artrópodos benéficos.
- No aplicar en época de floración.
- Peligroso para peces, no contaminar, lagos, ríos, estanques, o arroyos con los desechos y envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de aplicación o sobrantes del producto.
- Respetar una banda o zona de no aplicación hacia cuerpos de agua o áreas no objetivas de al menos 5 metros.
- Es peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- Evitar el uso del producto en zonas con napas freáticas superficiales.
- En caso de derrame, recoger el producto y depositarlo, en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.

# REMATA 20 SP

## PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA INSECTICIDA AGRICOLA

Polvo soluble SP

**Composición:**

Acetamiprid ..... 200 g/Kg  
Aditivos..... c.s.p 1 Kg

**Registro PQUA N° 826 - SENASA**

Titular del registro:  
**FITOCORP SAC**  
Jr. Las Poncianas N° 147. Urb. La Molina vieja. La Molina - Lima  
Teléfono: 0165221820

Formulador:  
**BETA CHEMICALS**  
Rm.707, Blk. A, Kingsound Center, No. 116 Zizhuyuan Road,  
Beijing 100097, China

Importado y distribuido por:



Contenido Neto: 1Kg  
Lote Nro:  
Fecha de Formulación:  
Fecha de Vencimiento:

**NO CORROSIVO      NO INFLAMABLE      NO EXPLOSIVO**



**MODERADAMENTE PELIGROSO  
DAÑINO**

**INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO**

**REMATA 20 SP** es un insecticida de contacto e ingestión interactúa con los receptores de acetilcolina del sistema nervioso central y periférico uniéndose a ellos irreversiblemente, resultando en excitación y parálisis que conduce finalmente a la muerte de los insectos. **REMATA 20 SP** se recomienda para el control de *Bemisia tabaci* en el cultivo de pimiento y control de *Aleurothrixus floccosus* en el cultivo de mandarina.

“CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO”

CULTIVOS	PLAGA		DOSIS		P.C (días)	L.M.R. (ppm)
	Nombre Común	Nombre Científico	Kg/200L	Kg/Ha		
Pimiento	Mosca blanca	<i>Bemisia tabaci</i>	0.10	0.30	7	0.3
Mandarina	Mosca blanca lanuda de los cítricos	<i>Aleurothrixus floccosus</i>	0.10	-	14	1
Palto	Mosca blanca	<i>Aleurodicus juleikae</i>	0.10	-	21	0.01

P.C: Periodo de carencia      LMR: Limite Máximo de Residuos (partes por millón).

**FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN**

Puede ser aplicado hasta 2 veces por campaña. Cuando las condiciones medioambientales sean propicias para el desarrollo de la plaga, previa evaluación. No aplicar en época de floración.

**PERIODO DE REINGRESO**

No reingresar al área tratada antes de las 24 horas de aplicado el producto.

**COMPATIBILIDAD**

**REMATA 20 SP** es incompatible con productos que contienen aluminio, y con ácidos y bases fuertes (pH <2 o pH >11).

**FITOTOXICIDAD**

No es fitotóxico en los cultivos si se emplea a la dosis indicada.

**RESPONSABILIDAD CIVIL**

El titular del registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las indicaciones e instrucciones dadas.

15.0 cm

