

LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO
"MANTENGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN:

- Tóxico por ingestión.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Utilizar ropa protectora durante el manejo y aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.
- Usar máscara, guantes y gafas protectoras durante el manejo del producto.
- Posibles riesgos de efectos irreversibles por inhalación.
- Almacenar el producto en lugar sombreado seco y ventilado en sus envases originales bien cerrados, lejos de la luz directa.
- No almacenar, ni transportar junto con alimentos, bebidas, medicinas, ni forrajes.
- Después de usar el producto cambiarse de ropa y bañarse con abundante agua y jabón.
- Realice la operación siguiendo la dirección del viento.
- En caso de incendio se generan gases tóxicos y/o irritantes; usar respirador o máscara de protección.

PRIMEROS AUXILIOS

- Grupo Químico: Avermectinas
- En caso de presentar los síntomas de intoxicación llame al médico inmediatamente, o lleve al paciente al médico y muéstrela la etiqueta.
- No hay antídoto específico. El tratamiento es sintomático.
- En caso de ingestión, no provoque el vómito en la persona, a menos que así lo indique un profesional en salud.
- En caso de contacto con los ojos y la piel, enjuagarlos con abundante agua por lo menos durante 15 minutos.
- En caso de inhalación, colocar a la persona en un sitio con aire fresco y monitorear la respiración, si fuera necesario practicar respiración artificial.

TELÉFONOS DE EMERGENCIA:
 CICOTOX: 0-800-1-3040
 POINT ANDINA S.A.: (01) 348-1018
 ESSALUD: 117

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

- Después de usar el contenido, destruya el envase triturándolo o perforándolo y deposítelos en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE

- Peligroso para abejas u otros artrópodos benéficos; no aplicar en época de floración.
- Peligroso para organismos acuáticos.
- No contaminar lagos, ríos, estanques o arroyos con los desechos y envases vacíos.

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

CUADROS DE USOS:

CULTIVO	PLAGAS		Dosis g/ha	Dosis g/cil 200L	Periodo de carencia (días)	L.M.R. (ppm)
	Nombre Común	Nombre Científico				
"Arándano"	"Perforador del fruto"	<i>Heliothis virescens</i>	-	100	5	0.01
"Pimiento"	"Perforador del fruto"	<i>Heliothis virescens</i>	200	-	7	0.01

L.M.R. Límite Máximo de Residuos

- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 5m.
- Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- El producto no debe aplicarse en zonas con napas freáticas superficiales o en suelos altamente permeables.
- El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.
- En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en el sitio destinado por las autoridades locales para este fin.

INSTRUCCIONES DEL USO Y MANEJO

- **ARISTOCRAT 50 SG** es un insecticida de contacto e ingestión. Cuando la larva ingiere el producto presente en el tejido vegetal (de 1 a 4 horas) la larva deja de alimentarse deteniendo así el daño que pueda estar ocasionando. Entre 12 y 24 horas más tarde son incapaces de moverse y quedan irreversiblemente paralizadas causando la muerte del insecto.

- Para la aplicación de **ARISTOCRAT 50 SG**, mezclar la dosis recomendada en un poco de agua hasta obtener una suspensión uniforme. Luego vaciar el contenido en un cilindro o tanque de aplicación y completar con agua hasta la capacidad total. Aplicar con mochila mecánica o a motor.

- No hacer aplicaciones consecutivas de **ARISTOCRAT 50 SG**. Se recomienda hacer las aplicaciones en un programa que incluya productos de diferente modo de acción y así evitar la aparición de resistencia.

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN

- De acuerdo a la incidencia (monitoreo) del insecto. Aplicar a la floración y fructificación.
- Número máximo de aplicaciones por campaña: 2
- En el cultivo del arándano se recomienda 1 sola aplicación/campaña.

PERIODO DE REINGRESO

- Puede reingresar a las 24 horas después de aplicado el producto.

COMPATIBILIDAD

- **ARISTOCRAT 50 SG** es compatible con la mayoría de plaguicidas de reacción neutra.

FITOTOXICIDAD

- **ARISTOCRAT 50 SG** no es fitotóxico cuando se utiliza como es indicado en la etiqueta.

RESPONSABILIDAD CIVIL:

El titular de registro garantiza que el producto contenido en este envase concuerda con las características físico químicas indicadas en la etiqueta y es apto para los fines que se recomienda, siguiendo las instrucciones dadas en el cuadro de usos.

ARISTOCRAT®

50 SG

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

INSECTICIDA AGRÍCOLA

Granulos solubles (SG)

COMPOSICIÓN:

Etmectin benzoate.....52.64 g/kg
 Aditivos.....c.s.p. 1kg

Reg. PQUA N° 825 - SENASA

Titular de Registro:

Point Andina S.A.
 Calle Loreto N° 304. Urb. Santa Patricia
 II Etapa. La Molina. Lima-Perú
 Telf. 348-1018/ 349-9609

Fabricado y formulado por:

Point Agro China Ltd.
 Wan Shi Town. Yixing, Jiangsu, 214217, China

Importado y distribuido por:

Soluciones Técnicas del Agro S.A.C
 Av. Guillermo Dansey N°2176
 Lima - Cercado
 Telf: (01) 3368645 Fax: (01) 3368299

Softagro®
 Soluciones Técnicas del Agro S.A.C.

Contenido Neto: 750 g
 Lote N°
 Fecha de Formulación:
 Fecha de Vencimiento:

NO CORROSIVO

NO INFLAMABLE

NO EXPLOSIVO



**MODERADAMENTE PELIGROSO
 DAÑINO**

